


3.4.5 Fumeurs/ses ayant tenté d'arrêter de fumer

Les fumeurs/ses quotidiens/nes ont été interrogés sur le fait d'avoir tenté d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois, sur le nombre de tentatives en question, sur la durée de la plus longue tentative, sur les personnes ou autres sources d'informations « impliquées » et sur les aides à la désaccoutumance employées. Les fumeurs/ses occasionnels/les ayant été interrogés sur cette thématique sur la deuxième partie de l'année, seul les résultats d'ensembles sont présentés pour eux.

Tentatives d'arrêt, nombres de tentatives et durée de la période d'arrêt la plus longue

Figure 3.4.16_MB Tentative(s) d'arrêt de consommation de tabac au cours des 12 derniers mois*



Remarque : * Fumeurs/ses occasionnels/les : données recueillies uniquement sur le période juillet-décembre 2011.

Figure 3.4.17_MB Tentative(s) d'arrêt de consommation de tabac au cours des 12 derniers mois, chez les fumeurs/ses quotidiens/nes, au total, par sexe, par région linguistique et par âge




Figure 3.4.18_MB Nombre de tentatives d'arrêt au cours des 12 derniers mois (fumeurs/ses quotidiens/nes avec tentatives sur cette période), au total, par sexe, par région linguistique et par âge





Figure 3.4.19_MB *Durée de la plus longue tentative d'arrêt des 12 derniers mois (fumeurs/ses quotidiens/nes avec tentatives sur cette période), au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par nombre de cigarettes fumées quotidiennement*



Commentaire :


Approximativement un quart des fumeurs/ses – 24.6% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 25.4% des occasionnels/les – révélait avoir essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois. Les 15-19 ans, les 25-34 ans et les 65-74 ans étaient les groupes d'âge pour lesquels des tentatives d'arrêt étaient les plus fréquemment reportées.

Un peu plus d'un tiers – 36.0% – des fumeurs/ses quotidiens/nes ayant essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois rapportait plus d'une tentative d'arrêt ; les tentatives multiples semblent être plus fréquentes dans les groupes d'âge les plus jeunes (en dessous de 25 ans) et les plus âgés (en dessus de 64 ans). Aussi, moins d'un tiers – 29.9% – des fumeurs/ses ayant tenté d'arrêter de fumer sont parvenus à tenir plus d'un mois sans rechute.

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population, et notamment en Suisse italienne, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres présentés dans certaines figures ci-dessus.


Sources d'information et aide à la désaccoutumance

Figure 3.4.20_MB Personne(s)/moyen(s) consulté(s) pour arrêter de fumer lors de la dernière tentative d'arrêt (fumeurs/ses quotidiens/nes), au total, par sexe et par région linguistique



Remarque : Seules les catégories les plus fréquentes ont été représentées usage multiple possible.

Figure 3.4.21_MB Aide(s) à la désaccoutumance employé(s) lors de la dernière tentative d'arrêt (fumeurs/ses quotidiens/nes), au total, par sexe et par région linguistique



Remarque : Seules les catégories les plus fréquentes ont été représentées usage multiple possible.

Commentaire :

Les sources d'information les plus fréquemment citées comme ayant été consultées par les fumeurs/ses quotidiens/nes lors de leur dernière tentative d'arrêt étaient des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, ou autre professionnel de la santé), les proches (conjoint, famille, connaissances, amis) et la consultation de sites d'information en ligne. Les chewing-gums et pansements à la nicotine étaient les aides à la désaccoutumance les plus fréquemment mentionnés par les personnes n'étant pas parvenues à arrêter de fumer (parmi les aides spécifiquement destinées à cet effet) ; Une part relativement importante de ces personnes mentionnaient avoir eu recours à des aides qui n'étaient pas spécifiquement destinées à arrêter de fumer.

Aussi, à titre de brève comparaison avec les données en lien aux aides à la désaccoutumance mentionnées par les ex-fumeurs/ses (voir sous point 3.4.6, *Figure 3.4.31* et *Table 3.4.31a* en annexe), il est intéressant de remarquer que la part de répondants disant n'avoir pas employé d'aide particulière est beaucoup plus conséquente chez les personnes qui sont parvenues à arrêter de fumer (83.3%) que chez les personnes qui n'y sont pas parvenues (54.3%). Bien que cette différence puisse en partie s'expliquer par un effet d'oubli (p.ex. pour les personnes ayant arrêté de fumer il y a longtemps), un fort effet de la motivation à l'arrêt peut également être suggéré (p.ex. arrêt sur la base de la motivation en plus d'une aide particulière pour les personnes à forte motivation à l'arrêt).

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population, et notamment en Suisse italienne, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres présentés dans certaines figures ci-dessus.

Source des médicaments en cas d'aide médicamenteuse

Sur les sept répondants³ qui ont été interrogés sur l'origine des médicaments utilisés lors de leur dernière tentative d'arrêt de consommation de tabac, cinq ont dit les avoir reçus de leur médecin et deux se les être procurés en pharmacie sur ordonnance.

3.4.6 Ex-fumeurs/ses : éléments en lien à l'arrêt de consommation

Les ex-fumeurs/ses ont été interrogés sur leur vécu en lien avec l'arrêt de consommation de tabac. Les thèmes considérés portaient sur le temps écoulé depuis l'arrêt, au niveau de consommation avant l'arrêt, au nombre de tentatives infructueuses, à la manière de gérer la consommation avant l'arrêt, aux raisons pour lesquelles l'arrêt était souhaité et aux sources d'informations et aides à la désaccoutumance consultées ou employées.

L'ensemble des questions ont été abordés avec les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes (qui l'on été pendant au moins 6 mois) sur l'ensemble de l'année, alors que les ex-fumeurs/ses « occasionnels/les » n'ont été interrogés sur leur arrêt de consommation (à l'exception du temps écoulé depuis l'arrêt) que sur la deuxième moitié de l'année. Ainsi, seuls les résultats en lien aux ex-fumeurs/ses quotidiens/nes sont présentés ici pour l'ensemble de questions. Les résultats pour les ex-fumeurs/ses occasionnels/les sont présentés uniquement lorsque le nombre de personnes concernées a été jugé satisfaisant⁴.


³ Une personne qui est parvenue à arrêter de fumer et pour qui l'aide médicamenteuse était considérée comme principale aide plus six personnes qui ne sont pas parvenues à arrêter (nombres non-pondérés).

⁴ D'une manière générale - à l'exception des données en lien au temps écoulé depuis l'arrêt de consommation - les résultats en liens aux données collectées uniquement sur la deuxième partie de l'année ne sont pas présentés de par le fait que le nombre de répondants était trop restreint (n non pondéré < 65, sur l'ensemble de la population).

Temps écoulé depuis l'arrêt


La question portant sur le temps écoulé depuis l'arrêt de consommation n'a été posée qu'aux ex-fumeurs/ses ayant fumé au moins 100 cigarettes (ou une quantité équivalente de tabac) au cours de leur vie. Toutefois, il est important de noter que pour la période janvier-juin 2011, les données ne sont disponibles que pour les ex-fumeurs/ses ayant fumé quotidiennement au moins pendant 6 mois (« ex-fumeurs/ses quotidiens de longue durée »). Depuis juillet, les données existent pour tous les ex-fumeurs/ses.

Figure 3.4.22 Temps écoulé (en années) depuis l'arrêt de consommation (parmi les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes*) au total, par sexe, par région linguistique et par âge



* Remarque : Fumeurs/ses ayant fumé au minimum 6 mois quotidiennement

Figure 3.4.23 Temps écoulé (en années) depuis l'arrêt de consommation parmi les ex-fumeurs/ses occasionnels/les*, au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque : *Données recueillies uniquement sur la période juillet-décembre 2011 ; fumeurs n'ayant pas fumé de manière quotidienne sur plus de 6 mois.

Commentaire:


Chez les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes, le temps écoulé moyen depuis l'arrêt de la consommation augmente d'une manière générale avec l'âge (arrêt de la consommation des personnes plus âgées généralement plus éloigné dans le temps que pour les personnes plus jeunes), mais peu de différences sont observables entre hommes et femmes et entre régions linguistiques.

Peu de différences sont observées entre les ex-fumeurs/ses ayant fumé quotidiennement pendant au moins 6 mois et les autres ex-fumeurs/ses sur la base des données collectées entre juillet et décembre 2011 (période durant laquelle tous les ex-fumeurs/ses ont été interrogés sur cette thématique).

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population, et notamment en Suisse italienne, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres présentés dans certaines figures ci-dessus.

Niveau de consommation avant l'arrêt

Figure 3.4.24_MB Nombre de cigarettes fumées quotidiennement avant l'arrêt par les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes, au total, par sexe et par région linguistique




Commentaire :

Plus de la moitié – 51.4% – des ex-fumeurs/ses quotidiens/nes (ayant fumé quotidiennement pendant au minimum 6 mois) affirment avoir eu un niveau de consommation de plus de 15 cigarettes par jour avant d'avoir arrêté de fumer.

Nombre de tentatives


Figure 3.4.25_MB Nombre de tentatives avant l'arrêt de consommation par les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes, au total, par sexe, par région linguistique et par nombre de cigarettes fumées avant l'arrêt



Commentaire :

57.4% des ex-fumeurs/ses quotidiens/nes - ayant fumé quotidiennement pendant au minimum 6 mois - révélèrent avoir réussi à arrêter de fumer lors de leur première ou deuxième tentative d'arrêt ; une légère tendance à la hausse du nombre de tentatives allant apparemment de pair avec un niveau plus élevé de consommation avant l'arrêt.

Figure 3.4.31_MB Aide(s) à la désaccoutumance employé(s) par les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes pour arrêter de fumer, au total, par sexe, par région linguistique et par nombre d'années depuis l'arrêt



Remarque : Seules les catégories les plus fréquentes ont été représentées usage multiple possible.

Commentaire :

Les trois principales sources d'information, personnes ou autre moyen d'information consultées par les ex-fumeurs/ses lors de leur arrêt de consommation étaient a) des livres, b) un médecin et c) des proches (conjoint ou membres de la famille). Quant aux aides à la désaccoutumance, une large majorité des répondants soutenaient ne pas avoir bénéficié d'aide particulière (voir Table 3.4.31a en annexe) ; les pansements et les chewing-gums à la nicotine s'avérant néanmoins être les aides les plus fréquemment mentionnées par les personnes ayant arrêté de fumer (et reportant avoir bénéficié d'aide).

3.5 Références

Fagerström, K. O., Heatherton, T. F. & Kozlowski, L. T. (1990). Nicotine addiction and its assessment. *Ear, Nose and Throat Journal* 69, 763-765.

Fagerström, K. O., Kunze, M., Schoberberger, R., Breslau, N., Hughes, J. R., Hurt, R. D., Puska, P., Ramstrom, L. & Zatonski, W. (1996). Nicotine dependence versus smoking prevalence: comparisons among countries and categories of smokers. *Tobacco Control* 5, 52-56.

Gallus, S. & La Vecchia, C. (2004). A population-based estimate of tobacco dependence. *European Journal of Public Health* 14, 93-94.

Klug, S. (février 2012). CoRoIAR - Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks: La pondération. Les méthodes et l'assurance de la qualité chez DemoSCOPE. Adligenswil: DemoSCOPE.



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Oktober 2012

Tabak

Tabellen – Daten 2011

Dieses Projekt wurde vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben und finanziert.
Mit Unterstützung des Tabakpräventionsfonds.
Vertrag Nr. 09.007029 und Vertrag Nr. 10.008645.



SUCHT | SCHWEIZ

Impressum

- Auskunft:** Johanna Dayer Schneider und Wally Achtermann, wally.achtermann@bag.admin.ch,
Tel. 031/325 90 41
- Bearbeitung:** Sucht Schweiz: Gerhard Gmel, Hervé Kuendig, Etienne Maffli, Luca Notari, Matthias Wicki,
Aurélien Georges, Elisabeth Grisel-Staub; IBSF: Max Müller; IUMSP: Françoise
Dubois-Arber, Jean-Pierre Gervasoni, Sonia Lucia, André Jeannin; ISGF: Ambros
Uchtenhagen, Michael Schaub
- Vertrieb:** Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit, Nationale
Präventionsprogramme
- Grafik/Layout:** Sucht Schweiz und Gloor Informatik
- Korrektorat:** Kopfwerken GmbH
- Copyright:** © Bundesamt für Gesundheit, Bern 2012

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Tabellenverzeichnis | V |
| 3. Tabak | 1 |
| 3.1 Themenbereich Tabak: Einleitung | 1 |
| 3.2 Tabakkonsum | 1 |
| 3.2.1 <i>Rauchstatus</i> | 1 |
| 3.2.2 <i>Menge und Art der konsumierten Tabakwaren</i> | 2 |
| 3.2.3 <i>Alter bei Beginn des täglichen Konsums</i> | 8 |
| 3.2.4 <i>Grad der Nikotinabhängigkeit</i> | 9 |
| 3.2.5 <i>Konsumententwicklung</i> | 9 |
| 3.3 Passivrauchen | 10 |
| 3.3.1 <i>Passivrauchexposition</i> | 10 |
| 3.3.2 <i>Meinungen zum Thema Passivrauchen</i> | 13 |
| 3.3.3 <i>Passivrauchen am Arbeitsplatz</i> | 16 |
| 3.3.4 <i>Passivrauchen in der Wohnung</i> | 17 |
| 3.3.5 <i>Tabakkonsum im nächsten Umfeld</i> | 20 |
| 3.4 Entwöhnung | 21 |
| 3.4.1 <i>Wunsch und Absicht aufzuhören</i> | 21 |
| 3.4.2 <i>Reduktionswunsch</i> | 25 |
| 3.4.3 <i>Rat zum Rauchstopp und für kommenden Aufhörversuch erwogene Entwöhnungshilfen</i> | 27 |
| 3.4.4 <i>Rauchstopplinie</i> | 30 |
| 3.4.5 <i>Aufhörversuche</i> | 31 |
| 3.4.6 <i>Ex-Rauchende: Angaben zum Rauchstopp</i> | 35 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---------------------------|---|
| 3. Tabak | 1 |
| <i>Tabelle 3.2.1a</i> | <i>Rauchstatus – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> |
| <i>Tabelle 3.2.1b</i> | <i>Rauchstatus – nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.1c</i> | <i>Konsumhäufigkeit bei den Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.1d</i> | <i>Konsumhäufigkeit bei den Rauchenden – Total und nach Alter.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.2a</i> | <i>Rauchstatus bei den Männern – nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.2b</i> | <i>Rauchstatus bei den Frauen – nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.3</i> | <i>Durchschnittlicher Zigarettenkonsum pro Tag.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.4a</i> | <i>Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.4b</i> | <i>Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.5/6a</i> | <i>Art und Anzahl der von Täglich-Rauchenden gerauchten Zigaretten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> |
| <i>Tabelle 3.2.5/6b</i> | <i>Art und Anzahl der von Täglich-Rauchenden gerauchten Zigaretten – Total und nach Alter.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.7a</i> | <i>Art und Anzahl der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Zigaretten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> |
| <i>Tabelle 3.2.7b</i> | <i>Art und Anzahl der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Zigaretten – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.8a</i> | <i>Art und Kombinationen der von Täglich-Rauchenden gerauchten Tabakwaren – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> |
| <i>Tabelle 3.2.8b :</i> | <i>Art und Kombinationen der von Täglich-Rauchenden gerauchten Tabakwaren – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.9a</i> | <i>Art und Kombinationen der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Tabakwaren – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.9b:</i> | <i>Art und Kombinationen der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Tabakwaren – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.10a</i> | <i>Konsum rauchloser Tabakprodukte – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.10b</i> | <i>Konsum rauchloser Tabakprodukte – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.10c</i> | <i>Konsum rauchloser Tabakprodukte – nach Rauchstatus.....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.11a</i> | <i>Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem täglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.11b</i> | <i>Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem täglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter (bei den Männern).....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.11c</i> | <i>Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem täglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter (bei den Frauen).....</i> |
| <i>Tabelle 3.2.12a_MB</i> | <i>Grad der Nikotinabhängigkeit der Täglich-Rauchenden gemäss FTND – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> |
| <i>Tabelle 3.2.12b_MB</i> | <i>Grad der Nikotinabhängigkeit der Täglich-Rauchenden gemäss FTND – Total und nach Alter</i> |
| <i>Tabelle 3.2.13_MB</i> | <i>Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden und den Gelegenheitsrauchenden*)</i> |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| <i>Tabelle 3.2.14a_MB</i> | <i>Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>10</i> |
| <i>Tabelle 3.2.14b_MB</i> | <i>Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter</i> | <i>10</i> |
| <i>Tabelle 3.3.1a_MB</i> | <i>Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>10</i> |
| <i>Tabelle 3.3.1b_MB</i> | <i>Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Alter</i> | <i>11</i> |
| <i>Tabelle 3.3.1c_MB</i> | <i>Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>11</i> |
| <i>Tabelle 3.3.2b_MB</i> | <i>Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) von Schüler/innen, Studierenden und Berufstätigen in der Schule oder bei der Arbeit – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>12</i> |
| <i>Tabelle 3.3.3a_MB</i> | <i>Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>13</i> |
| <i>Tabelle 3.3.3b_MB</i> | <i>Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Alter</i> | <i>13</i> |
| <i>Tabelle 3.3.3c_MB</i> | <i>Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>13</i> |
| <i>Tabelle 3.3.4a_MB</i> | <i>Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>14</i> |
| <i>Tabelle 3.3.4b_MB</i> | <i>Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Alter</i> | <i>14</i> |
| <i>Tabelle 3.3.4c_MB</i> | <i>Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>14</i> |
| <i>Tabelle 3.3.5a_MB</i> | <i>Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabelle 3.3.5b_MB</i> | <i>Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Alter</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabelle 3.3.5c_MB</i> | <i>Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabelle 3.3.6a_MB</i> | <i>Kenntnis vom Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Nichtrauchernden vor Passivrauchen bei der Arbeit (nur Erwerbstätige) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>16</i> |
| <i>Tabelle 3.3.6b_MB</i> | <i>Kenntnis vom Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Nichtrauchernden vor Passivrauchen bei der Arbeit (nur Erwerbstätige) – Total und nach Alter</i> | <i>16</i> |
| <i>Tabelle 3.3.7a_MB</i> | <i>Geltende Raucherregelungen bei der Arbeit an geschlossenen Orten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion (nur Erwerbstätige)</i> | <i>17</i> |
| <i>Tabelle 3.3.7b_MB</i> | <i>Geltende Raucherregelungen bei der Arbeit an geschlossenen Orten – Total und nach Alter (nur Erwerbstätige)</i> | <i>17</i> |
| <i>Tabelle 3.3.8_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – nach Rauchstatus</i> | <i>17</i> |
| <i>Tabelle 3.3.9a_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion (alle Rauchenden)</i> | <i>18</i> |
| <i>Tabelle 3.3.9b_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Alter (alle Rauchenden)</i> | <i>18</i> |
| <i>Tabelle 3.3.10a_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit einer anderen Person in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>18</i> |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| <i>Tabelle 3.3.10b_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit einer anderen Person in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Alter.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Tabelle 3.3.11a_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>19</i> |
| <i>Tabelle 3.3.11b_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Alter</i> | <i>19</i> |
| <i>Tabelle 3.3.11c_MB</i> | <i>Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>20</i> |
| <i>Tabelle 3.3.12a_MB</i> | <i>Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Tabelle 3.3.12b_MB</i> | <i>Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Alter.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Tabelle 3.3.12c_MB</i> | <i>Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>21</i> |
| <i>Tabelle 3.4.1_MB</i> | <i>Aufhörwunsch – nach Rauchstatus*</i> | <i>21</i> |
| <i>Tabelle 3.4.2a_MB</i> | <i>Aufhörwunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Tabelle 3.4.2b_MB</i> | <i>Aufhörwunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Tabelle 3.4.3a_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabelle 3.4.3b_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Alter</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabelle 3.4.3c_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabelle 3.4.4a_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabelle 3.4.4b_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Alter</i> | <i>23</i> |
| <i>Tabelle 3.4.4c_MB</i> | <i>Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsrauchende) – Total und nach Rauchstatus</i> | <i>23</i> |
| <i>Tabelle 3.4.5a_MB</i> | <i>Aufhörbereitschaft der Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Tabelle 3.4.5b_MB</i> | <i>Aufhörbereitschaft der Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter</i> | <i>24</i> |
| <i>Tabelle 3.4.6a_MB</i> | <i>Aufhörbereitschaft der Gelegenheitsrauchenden* – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Tabelle 3.4.6b_MB</i> | <i>Aufhörbereitschaft der Gelegenheitsrauchenden* – Total und nach Alter*</i> | <i>25</i> |
| <i>Tabelle 3.4.7a_MB</i> | <i>Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Tabelle 3.4.7b_MB</i> | <i>Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter</i> | <i>25</i> |
| <i>Tabelle 3.4.7c_MB</i> | <i>Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – nach Anzahl Jahren seit Beginn des täglichen Konsums (nur Zigarettenraucher)</i> | <i>26</i> |
| <i>Tabelle 3.4.7d_MB</i> | <i>Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Zigarettenkonsum pro Tag (nur Zigarettenraucher)</i> | <i>26</i> |
| <i>Tabelle 3.4.8_MB</i> | <i>Reduktionswunsch bei den Gelegenheitsrauchenden* – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Tabelle 3.4.9a_MB</i> | <i>Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>27</i> |
| <i>Tabelle 3.4.9b_MB</i> | <i>Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter</i> | <i>27</i> |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| <i>Tabelle 3.4.10a_MB</i> | <i>Zum Rauchstopp ratende Person (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>27</i> |
| <i>Tabelle 3.4.10b_MB</i> | <i>Zum Rauchstopp ratende Person (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter</i> | <i>28</i> |
| <i>Tabelle 3.4.11_MB</i> | <i>Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>28</i> |
| <i>Tabelle 3.4.12a_MB</i> | <i>Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp in den nächsten 6 Monaten erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Tabelle 3.4.12b_MB</i> | <i>Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp in den nächsten 6 Monaten erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Alter</i> | <i>29</i> |
| <i>Tabelle 3.4.13a_MB</i> | <i>Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp (aber nicht in den nächsten 6 Monaten) erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Tabelle 3.4.13b_MB</i> | <i>Von Rauchenden mit Aufhörwunsch (aber nicht in den nächsten 6 Monaten) erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Alter</i> | <i>29</i> |
| <i>Tabelle 3.4.14a_MB</i> | <i>Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Tabelle 3.4.14b_MB</i> | <i>Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Alter</i> | <i>30</i> |
| <i>Tabelle 3.4.14c_MB</i> | <i>Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Rauchstatus.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Tabelle 3.4.15a_MB</i> | <i>Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>30</i> |
| <i>Tabelle 3.4.15b_MB</i> | <i>Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Alter</i> | <i>31</i> |
| <i>Tabelle 3.4.15c_MB</i> | <i>Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Rauchstatus.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Tabelle 3.4.16_MB</i> | <i>Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich- und den Gelegenheitsrauchenden*).....</i> | <i>31</i> |
| <i>Tabelle 3.4.17a_MB</i> | <i>Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Tabelle 3.4.17b_MB</i> | <i>Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter</i> | <i>32</i> |
| <i>Tabelle 3.4.18a_MB</i> | <i>Anzahl Aufhörversuche in den letzten 12 Monaten (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>32</i> |
| <i>Tabelle 3.4.18b_MB</i> | <i>Anzahl Aufhörversuche in den letzten 12 Monaten (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Alter.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Tabelle 3.4.19a_MB</i> | <i>Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>32</i> |
| <i>Tabelle 3.4.19b_MB</i> | <i>Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Alter</i> | <i>33</i> |
| <i>Tabelle 3.4.19c_MB</i> | <i>Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Zigarettenkonsum.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Tabelle 3.4.20_MB</i> | <i>Konsultierte Person(en)/Mittel zum Rauchstopp beim letzten Aufhörversuch (Täglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>34</i> |
| <i>Tabelle 3.4.21_MB</i> | <i>Entwöhnungshilfe(n) beim letzten Aufhörversuch (Täglich-Rauchende mit Aufhörversuch) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>35</i> |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| <i>Tabelle 3.4.22a</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Taglich-Rauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>35</i> |
| <i>Tabelle 3.4.22b</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Taglich-Rauchenden*) – Total und nach Alter</i> | <i>35</i> |
| <i>Tabelle 3.4.23a</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>36</i> |
| <i>Tabelle 3.4.23b</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Alter.....</i> | <i>36</i> |
| <i>Tabelle 3.4.23c</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei allen Ex-Rauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>36</i> |
| <i>Tabelle 3.4.23d</i> | <i>Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei allen Ex-Rauchenden*) – Total und nach Alter.....</i> | <i>36</i> |
| <i>Tabelle 3.4.24a_MB</i> | <i>Taglicher Zigarettenkonsum der Ex-Taglich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>37</i> |
| <i>Tabelle 3.4.24b_MB</i> | <i>Taglicher Zigarettenkonsum der Ex-Taglich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp.....</i> | <i>37</i> |
| <i>Tabelle 3.4.25a_MB</i> | <i>Anzahl Versuche der Ex-Taglich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>37</i> |
| <i>Tabelle 3.4.25b_MB</i> | <i>Anzahl Versuche der Ex-Taglich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabelle 3.4.26a_MB</i> | <i>Konsumreduktion vor dem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabelle 3.4.26b_MB</i> | <i>Konsumreduktion vor dem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabelle 3.4.27a_MB</i> | <i>Hat die Konsumreduktion den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp geholfen? – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabelle 3.4.27b_MB</i> | <i>Hat die Konsumreduktion den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp geholfen – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum</i> | <i>39</i> |
| <i>Tabelle 3.4.28a_MB</i> | <i>Angewendete Strategie zur Konsumreduktion vor gelungenem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>39</i> |
| <i>Tabelle 3.4.28b_MB</i> | <i>Angewendete Strategie zur Konsumreduktion vor gelungenem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum</i> | <i>39</i> |
| <i>Tabelle 3.4.29a_MB</i> | <i>Wichtigste Aufhorgrunde der Ex-Taglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>40</i> |
| <i>Tabelle 3.4.29b_MB</i> | <i>Wichtigste Aufhorgrunde (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp.....</i> | <i>41</i> |
| <i>Tabelle 3.4.30a_MB</i> | <i>Von den Ex-Taglich-Rauchenden konsultierte Person(en) oder Mittel zur Informationsbeschaffung beim Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>42</i> |
| <i>Tabelle 3.4.30b_MB</i> | <i>Von den Ex-Taglich-Rauchenden konsultierte Person(en) oder Mittel zur Informationsbeschaffung beim Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp</i> | <i>42</i> |
| <i>Tabelle 3.4.31a_MB</i> | <i>Von den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp verwendete Entwohnungshilfe(n) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion.....</i> | <i>43</i> |
| <i>Tabelle 3.4.31b_MB</i> | <i>Von den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp verwendete Entwohnungshilfe(n) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp</i> | <i>43</i> |

3. Tabak

3.1 Themenbereich Tabak: Einleitung

3.2 Tabakkonsum

3.2.1 Rauchstatus

Tabelle 3.2.1a Rauchstatus – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|-----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 4812 | 6174 | 8402 | 2064 | 520 | 10986 |
| <i>n gewichtet</i> | 5375 | 5597 | 8010 | 2466 | 496 | 10972 |
| Täglich-Rauchende | 21.1% | 15.7% | 17.5% | 20.7% | 20.0% | 18.3% |
| Gelegenheitsrauchende | 7.9% | 5.2% | 6.4% | 7.2% | 4.7% | 6.5% |
| Ex-Rauchende | 25.1% | 19.9% | 21.9% | 23.3% | 26.8% | 22.5% |
| Niemals-Rauchende | 45.9% | 59.3% | 54.2% | 48.7% | 48.5% | 52.7% |

Tabelle 3.2.1b Rauchstatus – nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 1914 | 1420 | 1771 | 1246 | 1186 | 1250 | 1258 | 941 | 10986 |
| <i>n gewichtet</i> | 749 | 867 | 1609 | 2140 | 1957 | 1520 | 1283 | 847 | 10972 |
| Täglich-Rauchende | 12.5% | 23.9% | 23.3% | 17.7% | 21.5% | 21.0% | 12.0% | 7.6% | 18.3% |
| Gelegenheitsrauchende | 10.0% | 11.3% | 8.8% | 7.1% | 6.2% | 4.2% | 3.6% | 2.0% | 6.5% |
| Ex-Rauchende | 3.0% | 7.3% | 16.1% | 23.7% | 24.4% | 29.1% | 36.3% | 26.9% | 22.5% |
| Niemals-Rauchende | 74.5% | 57.5% | 51.9% | 51.5% | 47.9% | 45.7% | 48.2% | 63.5% | 52.7% |

Tabelle 3.2.1c Konsumhäufigkeit bei den Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 1376 | 1355 | 2003 | 589 | 139 | 2731 |
| <i>n gewichtet</i> | 1559 | 1167 | 1914 | 690 | 123 | 2726 |
| täglich | 72.8% | 75.1% | 73.2% | 74.1% | 81.0% | 73.8% |
| mehrmals pro Woche | 9.2% | 7.7% | 9.1% | 7.7% | 5.6% | 8.6% |
| einmal pro Woche | 6.5% | 4.4% | 6.2% | 4.4% | 3.6% | 5.6% |
| seltener | 11.5% | 12.8% | 11.6% | 13.8% | 9.8% | 12.1% |

Tabelle 3.2.1d

Konsumhäufigkeit bei den Rauchenden – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 422 | 487 | 580 | 294 | 340 | 321 | 199 | 88 | 2731 |
| <i>n</i> gewichtet | 168 | 305 | 516 | 531 | 542 | 383 | 200 | 81 | 2726 |
| täglich | 55.8% | 67.8% | 72.7% | 71.2% | 77.6% | 83.3% | 77.2% | 79.1% | 73.8% |
| mehrmals pro Woche | 15.4% | 10.2% | 8.1% | 9.7% | 4.9% | 7.7% | 9.1% | 10.1% | 8.6% |
| einmal pro Woche | 8.9% | 6.8% | 8.0% | 5.6% | 4.3% | 3.6% | 2.1% | 5.1% | 5.6% |
| seltener | 20.0% | 15.1% | 11.3% | 13.4% | 13.1% | 5.4% | 11.7% | 5.7% | 12.1% |

Tabelle 3.2.2a

Rauchstatus bei den Männern – nach Alter

| Männer | Alter | | | | | | | | Total |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 967 | 696 | 712 | 530 | 532 | 473 | 551 | 351 | 4812 |
| <i>n</i> gewichtet | 414 | 471 | 796 | 1025 | 929 | 670 | 682 | 388 | 5375 |
| Täglich-Rauchende | 12.6% | 27.4% | 30.4% | 21.7% | 22.4% | 23.1% | 13.0% | 9.8% | 21.1% |
| Gelegenheitsrauchende | 10.6% | 12.4% | 9.4% | 10.1% | 6.7% | 5.1% | 5.2% | 3.0% | 7.9% |
| Ex-Rauchende | 3.4% | 6.8% | 14.9% | 24.9% | 24.0% | 33.7% | 47.8% | 40.0% | 25.1% |
| Niemals-Rauchende | 73.3% | 53.5% | 45.3% | 43.3% | 46.8% | 38.15% | 34.0% | 47.1% | 45.9% |

Tabelle 3.2.2b

Rauchstatus bei den Frauen – nach Alter

| Frauen | Alter | | | | | | | | Total |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 947 | 724 | 1059 | 716 | 654 | 777 | 707 | 590 | 6174 |
| <i>n</i> gewichtet | 335 | 396 | 813 | 1115 | 1028 | 850 | 601 | 459 | 5597 |
| Täglich-Rauchende | 12.5% | 19.7% | 16.4% | 14.0% | 20.7% | 19.3% | 10.9% | 5.7% | 15.7% |
| Gelegenheitsrauchende | 9.1% | 10.0% | 8.2% | 4.4% | 5.7% | 3.5% | 1.7% | 1.1% | 5.2% |
| Ex-Rauchende | 2.5% | 7.9% | 17.2% | 22.5% | 24.7% | 25.5% | 23.1% | 15.9% | 19.9% |
| Niemals-Rauchende | 75.9% | 62.4% | 58.2% | 59.1% | 48.9% | 51.6% | 64.3% | 77.3% | 59.3% |

3.2.2 Menge und Art der konsumierten Tabakwaren

Durchschnittlicher Zigarettenkonsum pro Tag

Tabelle 3.2.3 Durchschnittlicher Zigarettenkonsum pro Tag

| | Rauchende | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheitsrauchende |
| <i>n</i> ungewichtet* | 1853 | 283 |
| <i>n</i> gewichtet* | 1929 | 243 |
| durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten (pro Tag) | 14.3 | 1.5 |
| Standardabweichung | 8.0 | 2.6 |

Tabelle 3.2.4a Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Taglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 895 | 958 | 1338 | 410 | 105 | 1853 |
| <i>n</i> gewichtet | 1065 | 865 | 1335 | 498 | 96 | 1929 |
| durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten (pro Tag) | 15.6 | 12.7 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 14.3 |
| Standardabweichung | 8.4 | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 8.0 |

Tabelle 3.2.4b Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Taglich-Rauchenden – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet* | 229 | 323 | 403 | 211 | 257 | 245 | 130 | 55 | 1853 |
| <i>n</i> gewichtet* | 94 | 205 | 374 | 372 | 408 | 294 | 132 | 49 | 1929 |
| durchschnittliche Anzahl (pro Tag) | 11.6 | 12.8 | 12.7 | 15.3 | 16.1 | 15.0 | 13.8 | 11.9 | 14.3 |
| Standardabweichung | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 10.2 | 8.0 |

Art und Anzahl der gerauchten Zigaretten

Tabelle 3.2.5/6a Art und Anzahl der von Taglich-Rauchenden gerauchten Zigaretten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| Art der gerauchten Zigaretten | | | | | | |
| <i>n</i> ungewichtet | 895 | 964 | 1343 | 411 | 105 | 1859 |
| <i>n</i> gewichtet | 1065 | 870 | 1340 | 499 | 96 | 1936 |
| nur selbstgedrehte | 5.7% | 3.8% | 4.0% | 7.1% | 5.2% | 4.8% |
| selbstgedrehte und andere | 12.4% | 5.1% | 8.6% | 11.1% | 6.3% | 9.1% |
| nur industriell hergestellte | 81.9% | 91.1% | 87.5% | 81.8% | 88.5% | 86.1% |
| Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag | | | | | | |
| > 0-5 | 13.2% | 15.7% | 15.2% | 12.5% | 11.9% | 14.4% |
| 5 Stk. | 6.9% | 8.0% | 7.8% | 6.5% | 6.2% | 7.4% |
| 6-10 | 24.2% | 38.7% | 31.2% | 29.8% | 27.9% | 30.7% |
| 10 Stk. | 17.0% | 25.7% | 21.4% | 20.4% | 17.1% | 20.9% |
| 11-15 | 17.5% | 16.8% | 17.2% | 16.6% | 19.3% | 17.2% |
| 15 Stk. | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 14.3% | 12.5% | 11.6% |
| 16-20 | 33.0% | 24.3% | 27.9% | 31.3% | 34.2% | 29.1% |
| 20 Stk. | 31.7% | 23.1% | 26.8% | 29.5% | 34.2% | 27.8% |
| 21-30 | 8.7% | 3.6% | 5.5% | 8.7% | 6.7% | 6.4% |
| 30 Stk. | 5.5% | 2.5% | 3.2% | 6.7% | 4.9% | 4.2% |
| 31-40 | 3.1% | 0.7% | 2.6% | 0.8% | 0.0% | 2.0% |
| 41 und mehr | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |

Tabelle 3.2.5/6b

Art und Anzahl der von Taglich-Rauchenden gerauchten Zigaretten – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| Art der gerauchten Zigaretten | | | | | | | | | |
| <i>n ungewichtet</i> | 229 | 323 | 403 | 211 | 258 | 248 | 131 | 56 | 1859 |
| <i>n gewichtet</i> | 94 | 205 | 374 | 372 | 410 | 297 | 133 | 51 | 1936 |
| nur selbstgedrehte | 8.0% | 4.5% | 5.7% | 5.2% | 3.7% | 4.7% | 4.9% | 1.5% | 4.8% |
| selbstgedrehte und andere | 22.6% | 17.2% | 10.5% | 11.9% | 4.3% | 4.6% | 2.6% | 2.0% | 9.1% |
| nur industriell hergestellte | 69.5% | 78.3% | 83.8% | 82.8% | 92.0% | 90.7% | 92.5% | 96.5% | 86.1% |
| Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag | | | | | | | | | |
| > 0-5 | 22.3% | 15.4% | 17.9% | 15.7% | 9.6% | 10.0% | 13.0% | 27.0% | 14.4% |
| 5 Stk. | 7.8% | 10.2% | 12.2% | 6.9% | 4.9% | 2.6% | 7.8% | 10.0% | 7.4% |
| 6-10 | 36.8% | 37.3% | 35.5% | 25.4% | 25.4% | 31.3% | 30.1% | 36.0% | 30.7% |
| 10 Stk. | 22.6% | 22.5% | 22.8% | 16.7% | 21.2% | 22.7% | 18.8% | 21.3% | 20.9% |
| 11-15 | 18.9% | 19.7% | 17.2% | 14.9% | 19.5% | 12.7% | 22.5% | 13.7% | 17.2% |
| 15 Stk. | 9.9% | 13.8% | 11.6% | 10.9% | 14.4% | 6.8% | 14.4% | 8.7% | 11.6% |
| 16-20 | 17.9% | 22.4% | 23.3% | 31.3% | 33.6% | 38.1% | 27.5% | 18.4% | 29.1% |
| 20 Stk. | 16.7% | 21.2% | 22.3% | 29.5% | 32.7% | 36.7% | 26.9% | 15.9% | 27.8% |
| 21-30 | 3.8% | 2.9% | 5.7% | 8.9% | 7.7% | 6.4% | 6.5% | 0.0% | 6.4% |
| 30 Stk. | 2.5% | 0.8% | 3.6% | 6.3% | 5.4% | 3.9% | 4.5% | 0.0% | 4.2% |
| 31-40 | 0.0% | 2.4% | 0.3% | 2.9% | 3.9% | 1.2% | 0.4% | 3.3% | 2.0% |
| 41 und mehr | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 1.6% | 0.3% |

Tabelle 3.2.7a

Art und Anzahl der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Zigaretten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| Art der gerauchten Zigaretten | | | | | | |
| <i>n ungewichtet</i> | 129 | 180 | 239 | 59 | 11 | 309 |
| <i>n gewichtet</i> | 133 | 135 | 180 | 81 | 7 | 268 |
| nur selbstgedrehte | 3.7% | 1.8% | 3.2% | 2.0% | 0.0% | 2.8% |
| selbstgedrehte und andere | 14.6% | 10.0% | 13.3% | 11.1% | 0.0% | 12.3% |
| nur industriell hergestellte | 81.7% | 88.2% | 83.5% | 86.8% | 100.0% | 84.9% |
| Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag | | | | | | |
| < 1 | 63.4% | 60.4% | 59.0% | 66.9% | 83.8% | 62.0% |
| 1-5 | 26.0% | 34.3% | 36.2% | 16.8% | 13.9% | 29.9% |
| 6-10 | 10.1% | 4.4% | 3.8% | 16.4% | 2.3% | 7.4% |
| 11-15 | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 16-20 | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 21-30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31-40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 und mehr | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |

Anmerkung: Die Prozentwerte zu den Konsumschritten (5/10/15/20/30 Einheiten) werden nicht ausgewiesen, da die Befragung der Gelegenheitsrauchenden auf dem Zeitrahmen „wochentlich“ basierte.

*Nur fur den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.2.7b

Art und Anzahl der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Zigaretten – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| Art der gerauchten Zigaretten | | | | | | | | | |
| <i>n</i> ungewichtet | 86 | 65 | 74 | 29 | 22 | 15 | 14 | 4 | 309 |
| <i>n</i> gewichtet | 31 | 36 | 58 | 72 | 41 | 17 | 10 | 3 | 268 |
| nur selbstgedrehte | 8.3% | 2.7% | 1.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| selbstgedrehte und andere | 18.5% | 25.4% | 17.5% | 0.0% | 17.5% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | 12.3% |
| nur industriell hergestellte | 73.2% | 71.9% | 81.1% | 95.7% | 82.5% | 100.0% | 93.8% | 100.0% | 84.9% |
| Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag | | | | | | | | | |
| < 1 | 55.8% | 55.2% | 63.6% | 67.3% | 64.8% | 65.2% | 40.2% | 69.3% | 62.0% |
| 1-5 | 34.9% | 37.2% | 32.9% | 17.2% | 29.5% | 34.8% | 59.8% | 30.7% | 29.9% |
| 6-10 | 9.4% | 6.0% | 1.2% | 15.5% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% |
| 11-15 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 16-20 | 0.0% | 1.1% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 21-30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31-40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 und mehr | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |

Anmerkung: Die Prozentwerte zu den Konsumschritten (5/10/15/20/30 Einheiten) werden nicht ausgewiesen, da die Befragung der Gelegenheitsrauchenden auf dem Zeitrahmen „wöchentlich“ basierte.
*Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Gerauchte Tabakwaren: Art und Kombinationen

Tabelle 3.2.8a

Art und Kombinationen der von Täglich-Rauchenden gerauchten Tabakwaren – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 953 | 970 | 1394 | 421 | 108 | 1923 |
| <i>n</i> gewichtet | 1133 | 877 | 1401 | 510 | 99 | 2010 |
| Zigarette | 94.1% | 99.3% | 95.7% | 98.0% | 97.5% | 96.3% |
| Zigarre | 5.9% | 0.4% | 4.2% | 1.9% | 1.8% | 3.5% |
| Zigarillo | 3.6% | 1.1% | 2.8% | 2.0% | 1.8% | 2.5% |
| Wasserpfeife | 2.1% | 0.6% | 1.3% | 1.9% | 0.2% | 1.4% |
| Pfeife | 4.2% | 0.1% | 2.8% | 1.7% | 1.3% | 2.4% |
| Summe | 109.8% | 101.5% | 106.7% | 105.4% | 102.7% | 106.2% |
| Kombinationen: | | | | | | |
| nur Zigarette | 87.7% | 97.9% | 91.1% | 94.5% | 95.1% | 92.2% |
| Zigarette und andere | 6.3% | 1.4% | 4.5% | 3.4% | 2.4% | 4.2% |
| nur Zigarre | 1.5% | 0.0% | 1.1% | 0.2% | 0.7% | 0.9% |
| nur Zigarillo | 1.6% | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 1.8% | 1.2% |
| nur Wasserpfeife | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| nur Pfeife | 1.6% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.9% |
| andere Kombinationen | 1.1% | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.6% |

Anmerkung: Mehrfachantworten möglich.

Tabelle 3.2.8b : Art und Kombinationen der von Taglich-Rauchenden gerauchten Tabakwaren – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 229 | 326 | 404 | 214 | 266 | 264 | 150 | 70 | 1923 |
| <i>n gewichtet</i> | 94 | 206 | 375 | 377 | 421 | 319 | 154 | 64 | 2010 |
| Zigarette | 100.0% | 99.3% | 99.9% | 98.8% | 97.4% | 93.1% | 86.6% | 78.7% | 96.3% |
| Zigarre | 2.3% | 3.4% | 4.1% | 1.1% | 2.2% | 5.7% | 4.9% | 10.1% | 3.5% |
| Zigarillo | 1.4% | 2.6% | 1.4% | 0.6% | 2.5% | 4.9% | 4.8% | 5.2% | 2.5% |
| Wasserpfeife | 11.6% | 4.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.4% |
| Pfeife | 0.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 4.0% | 8.3% | 10.9% | 2.4% |
| Summe | 115.6% | 111.0% | 107.3% | 100.5% | 105.4% | 107.6% | 105.1% | 104.8% | 106.2% |
| Kombinationen: | | | | | | | | | |
| nur Zigarette | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| Zigarette und andere | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| nur Zigarre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| nur Zigarillo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| nur Wasserpfeife | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| nur Pfeife | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| andere Kombinationen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Anmerkung: Mehrfachantworten moglich.

Tabelle 3.2.9a Art und Kombinationen der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Tabakwaren – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 187 | 191 | 297 | 69 | 12 | 378 |
| <i>n gewichtet</i> | 205 | 145 | 246 | 95 | 9 | 350 |
| Zigarette | 64.9% | 93.0% | 73.0% | 85.3% | 80.8% | 76.5% |
| Zigarre | 43.2% | 2.6% | 23.2% | 37.1% | 0.0% | 26.4% |
| Zigarillo | 17.2% | 3.7% | 15.3% | 3.3% | 0.0% | 11.6% |
| Wasserpfeife | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 5.7% | 0.0% | 7.2% |
| Pfeife | 9.8% | 0.0% | 6.4% | 2.6% | 19.2% | 5.7% |
| Summe | 143.1% | 105.3% | 125.9% | 134.0% | 100.0% | 127.5% |
| Kombinationen: | | | | | | |
| nur Zigarette | 40.5% | 89.5% | 63.1% | 52.8% | 80.8% | 60.8% |
| Zigarette und andere | 24.5% | 3.5% | 9.9% | 32.5% | 0.0% | 15.8% |
| nur Zigarre | 15.3% | 1.3% | 10.0% | 8.9% | 0.0% | 9.5% |
| nur Zigarillo | 4.2% | 2.7% | 4.0% | 2.9% | 0.0% | 3.6% |
| nur Wasserpfeife | 2.3% | 3.0% | 2.6% | 2.9% | 0.0% | 2.6% |
| nur Pfeife | 3.2% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 19.2% | 1.9% |
| andere Kombinationen | 10.2% | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 6.0% |

Anmerkung: Mehrfachantworten moglich.

*Nur fur den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.2.9b: Art und Kombinationen der von Gelegenheitsrauchenden* gerauchten Tabakwaren – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 94 | 77 | 78 | 35 | 30 | 28 | 27 | 9 | 378 |
| <i>n</i> gewichtet | 34 | 46 | 64 | 84 | 57 | 34 | 24 | 8 | 350 |
| Zigarette | 91.7% | 78.5% | 91.5% | 86.1% | 72.2% | 48.3% | 42.0% | 35.4% | 76.5% |
| Zigarre | 6.6% | 17.4% | 2.2% | 49.3% | 21.3% | 30.4% | 55.7% | 46.3% | 26.4% |
| Zigarillo | 6.4% | 13.0% | 6.3% | 10.4% | 10.2% | 27.1% | 19.7% | 0.0% | 11.6% |
| Wasserpfeife | 21.7% | 12.4% | 6.1% | 2.7% | 7.8% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 7.2% |
| Pfeife | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 13.0% | 15.9% | 20.5% | 18.3% | 5.7% |
| Summe | 126.5% | 121.3% | 107.6% | 148.5% | 124.4% | 126.1% | 137.8% | 100.0% | 127.5% |
| Kombinationen: | | | | | | | | | |
| nur Zigarette | 74.1% | 71.6% | 87.3% | 49.5% | 59.0% | 41.4% | 29.7% | 35.4% | 60.8% |
| Zigarette und andere | 17.6% | 6.9% | 4.2% | 36.5% | 13.1% | 6.9% | 12.3% | 0.0% | 15.8% |
| nur Zigarre | 0.0% | 5.7% | 0.0% | 10.1% | 10.0% | 15.6% | 31.1% | 46.3% | 9.5% |
| nur Zigarillo | 0.0% | 3.2% | 3.6% | 1.1% | 3.2% | 12.3% | 7.2% | 0.0% | 3.6% |
| nur Wasserpfeife | 5.0% | 3.8% | 4.9% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
| nur Pfeife | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 9.0% | 3.3% | 18.3% | 1.9% |
| Andere Kombinationen | 3.3% | 8.8% | 0.0% | 2.7% | 7.9% | 14.8% | 16.3% | 0.0% | 6.0% |

Anmerkung: Mehrfachantworten möglich.
*Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Rauchlose Tabakprodukte

Tabelle 3.2.10a Konsum rauchloser Tabakprodukte – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 4821 | 6173 | 8402 | 2071 | 521 | 10994 |
| <i>n</i> gewichtet | 5373 | 5597 | 8000 | 2473 | 497 | 10970 |
| Schnupftabak | 3.4% | 1.1% | 2.8% | 0.6% | 0.2% | 2.2% |
| Lutschtabak (Snus) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| Kautabak | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Nikotinpflaster oder -kaugummi | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| mindestens etwas davon | 4.0% | 1.3% | 3.3% | 0.8% | 0.6% | 2.6% |
| nichts davon | 96.0% | 98.7% | 96.7% | 99.2% | 99.4% | 97.4% |

Tabelle 3.2.10b Konsum rauchloser Tabakprodukte – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 1914 | 1419 | 1773 | 1248 | 1186 | 1251 | 1256 | 947 | 10994 |
| <i>n</i> gewichtet | 749 | 865 | 1595 | 2143 | 1957 | 1522 | 1288 | 852 | 10970 |
| Schnupftabak | 5.7% | 7.6% | 4.5% | 1.2% | 1.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 2.2% |
| Lutschtabak (Snus) | 0.4% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Kautabak | 0.9% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Nikotinpflaster oder -kaugummi | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| mindestens etwas davon | 6.9% | 8.6% | 5.0% | 1.6% | 1.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 2.6% |
| nichts davon | 93.1% | 91.4% | 95.0% | 98.4% | 98.4% | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 97.4% |

Tabelle 3.2.10c

Konsum rauchloser Tabakprodukte – nach Rauchstatus

| | Taglich- Rauchende | Gelegenheits- rauchende | Ex-Rauchende | Niemals- Rauchende | Total |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| <i>n</i> ungewichtet | 1922 | 806 | 2069 | 6177 | 10974 |
| <i>n</i> gewichtet | 2007 | 714 | 2462 | 5762 | 10945 |
| Schnupftabak | 2.9% | 5.4% | 1.1% | 2.1% | 2.2% |
| Lutschtabak (Snus) | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Kautabak | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Nikotinpflaster oder -kaugummi | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| mindestens etwas davon | 3.5% | 6.1% | 1.6% | 2.4% | 2.6% |
| nichts davon | 96.5% | 93.6% | 98.4% | 97.6% | 97.3% |

3.2.3 Alter bei Beginn des taglichen Konsums

Tabelle 3.2.11a

Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem taglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-44 | 45-64 | 65+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 1192 | 719 | 1420 | 1355 | 1661 | 2430 | 2190 | 10967 |
| <i>n</i> gewichtet | 446 | 302 | 867 | 757 | 2991 | 3467 | 2123 | 10953 |
| < 15 Jahre | 5.5% | 5.4% | 4.0% | 6.6% | 4.1% | 2.7% | 0.9% | 3.3% |
| < 18 Jahre | - | 19.8% | 22.2% | 27.9% | 19.4% | 17.0% | 8.8% | 17.3% |
| < 20 Jahre | - | - | 28.0% | 34.7% | 30.1% | 29.1% | 17.8% | 27.3% |

Tabelle 3.2.11b

Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem taglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter (bei den Mannern)

| | Alter | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-44 | 45-64 | 65+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 601 | 366 | 696 | 541 | 701 | 1004 | 900 | 4809 |
| <i>n</i> gewichtet | 247 | 167 | 471 | 384 | 1436 | 1598 | 1068 | 5372 |
| < 15 Jahre | 5.2% | 5.5% | 4.3% | 8.4% | 4.0% | 3.0% | 1.4% | 3.6% |
| < 18 Jahre | - | 21.2% | 23.8% | 29.7% | 19.6% | 18.1% | 13.1% | 19.0% |
| < 20 Jahre | - | - | 30.2% | 38.0% | 33.9% | 29.3% | 26.7% | 30.9% |

Tabelle 3.2.11c

Anteil von Personen, die vor dem 15., 18. oder 20. Altersjahr mit dem taglichen Rauchen begonnen haben – Total und nach Alter (bei den Frauen)

| | Alter | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-44 | 45-64 | 65+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 591 | 353 | 724 | 814 | 960 | 1426 | 1290 | 6158 |
| <i>n</i> gewichtet | 199 | 135 | 396 | 373 | 1555 | 1869 | 1055 | 5581 |
| < 15 Jahre | 5.9% | 5.4% | 3.6% | 4.7% | 4.2% | 2.4% | 0.3% | 3.0% |
| < 18 Jahre | - | 18.1% | 20.2% | 26.1% | 19.3% | 16.0% | 4.4% | 15.7% |
| < 20 Jahre | - | - | 25.4% | 31.4% | 26.6% | 28.8% | 8.7% | 24.0% |

3.2.4 Grad der Nikotinabhängigkeit

Tabelle 3.2.12a_MB Grad der Nikotinabhängigkeit der Täglich-Rauchenden gemäss FTND – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 347 | 413 | 554 | 170 | 36 | 760 |
| <i>n</i> gewichtet | 360 | 361 | 494 | 201 | 26 | 721 |
| „sehr gering“ (0-2 Pkte) | 42.7% | 42.3% | 44.7% | 35.9% | 51.0% | 42.5% |
| „gering“ (3-4 Pkte) | 31.0% | 35.3% | 30.9% | 39.4% | 27.1% | 33.1% |
| „mittel“ (5 Pkte) | 7.3% | 14.0% | 12.4% | 7.7% | 0.0% | 10.7% |
| „stark“ (6-7 Pkte) | 16.7% | 6.8% | 9.7% | 15.9% | 20.4% | 11.8% |
| „sehr stark“ (8-10 Pkte) | 2.3% | 1.6% | 2.3% | 1.1% | 1.5% | 1.9% |

Tabelle 3.2.12b_MB Grad der Nikotinabhängigkeit der Täglich-Rauchenden gemäss FTND – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 116 | 137 | 160 | 97 | 84 | 91 | 55 | 20 | 760 |
| <i>n</i> gewichtet | 44 | 87 | 124 | 166 | 133 | 103 | 49 | 15 | 721 |
| „sehr gering“ (0-2 Pkte) | 46.5% | 62.6% | 42.1% | 40.3% | 34.9% | 37.9% | 42.9% | 39.1% | 42.5% |
| „gering“ (3-4 Pkte) | 41.6% | 27.4% | 35.1% | 33.8% | 34.0% | 30.2% | 28.1% | 46.6% | 33.1% |
| „mittel“ (5 Pkte) | 6.5% | 3.8% | 6.9% | 14.7% | 16.4% | 11.9% | 6.6% | 3.6% | 10.7% |
| „stark“ (6-7 Pkte) | 4.3% | 4.7% | 15.4% | 9.4% | 11.2% | 18.5% | 17.7% | 10.7% | 11.8% |
| „sehr stark“ (8-10 Pkte) | 1.1% | 1.4% | 0.6% | 1.8% | 3.5% | 1.5% | 4.6% | 0.0% | 1.9% |

3.2.5 Konsumententwicklung

Tabelle 3.2.13_MB Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden und den Gelegenheitsrauchenden*)

| | Rauchende | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheitsrauchende |
| <i>n</i> ungewichtet | 854 | 182 |
| <i>n</i> gewichtet | 826 | 196 |
| Zunahme | 14.6% | 5.8% |
| unverändert | 56.9% | 52.0% |
| Abnahme | 28.5% | 42.2% |

Anmerkung: *Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.2.14a_MB Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 396 | 458 | 618 | 194 | 42 | 854 |
| <i>n</i> gewichtet | 426 | 401 | 564 | 230 | 33 | 826 |
| Zunahme | 15.5% | 13.7% | 13.3% | 18.4% | 11.0% | 14.6% |
| unverändert | 55.2% | 58.8% | 57.3% | 56.0% | 55.8% | 56.9% |
| Abnahme | 29.4% | 27.5% | 29.4% | 25.6% | 33.2% | 28.5% |

Tabelle 3.2.14b_MB Verlauf des Tabakkonsums über die letzten 12 Monate (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 120 | 145 | 177 | 105 | 100 | 109 | 70 | 28 | 854 |
| <i>n</i> gewichtet | 46 | 92 | 144 | 179 | 156 | 122 | 66 | 21 | 826 |
| Zunahme | 52.5% | 19.9% | 20.1% | 14.2% | 9.5% | 3.6% | 4.9% | 8.0% | 14.6% |
| unverändert | 29.3% | 43.6% | 51.6% | 61.4% | 68.9% | 59.1% | 63.8% | 49.7% | 56.9% |
| Abnahme | 18.2% | 36.5% | 28.3% | 24.4% | 21.7% | 37.2% | 31.3% | 42.3% | 28.5% |

3.3 Passivrauchen

3.3.1 Passivrauchexposition

Tabelle 3.3.1a_MB Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 2087 | 2901 | 3841 | 926 | 221 | 4988 |
| <i>n</i> gewichtet | 2403 | 2580 | 3648 | 1127 | 208 | 4983 |
| < 1 | 64.2% | 70.7% | 68.9% | 63.8% | 65.4% | 67.6% |
| 1-2.5 | 20.5% | 17.1% | 18.3% | 20.6% | 16.8% | 18.7% |
| 3-6.5 | 9.0% | 7.5% | 7.5% | 10.5% | 9.0% | 8.2% |
| 7-13.5 | 3.4% | 2.4% | 2.8% | 3.1% | 3.2% | 2.9% |
| 14-27.5 | 1.6% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 4.1% | 1.4% |
| 28 + | 1.3% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 1.6% | 1.1% |

Tabelle 3.3.1b_MB Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | Total | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | | 75+ |
| <i>n ungewichtet</i> | 916 | 625 | 793 | 537 | 506 | 580 | 580 | 451 | 4988 |
| <i>n gewichtet</i> | 346 | 403 | 677 | 1000 | 929 | 672 | 571 | 385 | 4983 |
| < 1 | 29.1% | 27.3% | 52.3% | 71.0% | 77.2% | 81.3% | 83.1% | 92.4% | 67.6% |
| 1-2.5 | 34.5% | 32.1% | 29.0% | 17.6% | 15.0% | 12.2% | 12.5% | 5.3% | 18.7% |
| 3-6.5 | 21.0% | 23.2% | 12.3% | 6.3% | 5.0% | 4.5% | 2.6% | 1.4% | 8.2% |
| 7-13.5 | 9.6% | 8.9% | 3.6% | 2.3% | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 0.0% | 2.9% |
| 14-27.5 | 4.1% | 4.3% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 0.1% | 0.6% | 0.6% | 1.4% |
| 28 + | 1.7% | 4.2% | 1.4% | 1.4% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 1.1% |

Tabelle 3.3.1c_MB Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich- Rauchende | Gelegenheits- rauchende | Ex- Rauchende | Niemals- Rauchende | Tägl.- oder Gelegenheits- rauchende | Ex- und Niemals- Rauchende | Total |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------|
| | <i>n ungewichtet</i> | 853 | 356 | 955 | 2816 | 1209 | |
| <i>n gewichtet</i> | 834 | 337 | 1172 | 2632 | 1171 | 3804 | 4974 |
| < 1 | 47.7% | 55.3% | 78.2% | 70.7% | 49.8% | 73.0% | 67.5% |
| 1-2.5 | 21.7% | 23.6% | 15.6% | 18.6% | 22.3% | 17.7% | 18.8% |
| 3-6.5 | 17.5% | 13.0% | 3.4% | 6.8% | 16.2% | 5.8% | 8.2% |
| 7-13.5 | 6.6% | 3.5% | 1.3% | 2.4% | 5.7% | 2.1% | 2.9% |
| 14-27.5 | 3.7% | 1.8% | 0.7% | 1.0% | 3.1% | 0.9% | 1.4% |
| 28 + | 2.8% | 2.8% | 0.8% | 0.5% | 2.8% | 0.6% | 1.1% |

Tabelle 3.3.2a_MB Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) nach Ort oder Kontext der Exposition – Total und nach Rauchstatus

| | | Täglich- oder Gelegenheitsrauchernde | Ex- und Niemals- Rauchernde | Total |
|---|--------------|---|--------------------------------|-------|
| <i>n</i> ungewichtet | | 1209 | 3771 | 4980 |
| <i>n</i> gewichtet | | 1171 | 3804 | 4974 |
| Auto | 0 h | 80.8% | 93.9% | 90.8% |
| | <1 h | 10.7% | 4.3% | 5.8% |
| | 1-2 h | 5.6% | 1.3% | 2.3% |
| | 3-6 h | 2.3% | 0.3% | 0.8% |
| | > 6 h | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| Schule oder Arbeit* <i>*Berechnung gestützt auf drei Ausschlussfragen</i> | 0 h | 82.7% | 88.5% | 87.1% |
| | < 1 h | 8.1% | 6.8% | 7.1% |
| | 1-2 h | 4.9% | 2.8% | 3.3% |
| | 3-6 h | 2.6% | 1.3% | 1.6% |
| | mehr als 6 h | 1.6% | 0.7% | 0.9% |
| Rest., Cafés oder Bars | 0 h | 72.3% | 80.4% | 78.5% |
| | <1 h | 14.0% | 11.9% | 12.4% |
| | 1-2 h | 8.9% | 5.8% | 6.6% |
| | 3-6 h | 3.7% | 1.5% | 2.0% |
| | mehr als 6 h | 1.1% | 0.4% | 0.5% |
| bei Freunden | 0 h | 65.5% | 76.7% | 74.1% |
| | <1 h | 13.2% | 14.7% | 14.3% |
| | 1-2 h | 13.2% | 6.0% | 7.7% |
| | 3-6 h | 5.7% | 2.1% | 3.0% |
| | mehr als 6 h | 2.5% | 0.4% | 0.9% |
| zu Hause | 0 h | 80.2% | 94.9% | 91.4% |
| | < 1 h | 5.1% | 2.4% | 3.0% |
| | 1-2 h | 6.7% | 1.2% | 2.5% |
| | 3-6 h | 4.3% | 0.6% | 1.5% |
| | mehr als 6 h | 3.7% | 0.8% | 1.5% |
| Discos oder Clubs | 0 h | 86.7% | 91.0% | 90.0% |
| | < 1 h | 4.9% | 4.0% | 4.2% |
| | 1-2 h | 4.5% | 3.2% | 3.5% |
| | 3-6 h | 3.5% | 1.6% | 2.1% |
| | mehr als 6 h | 0.5% | 0.1% | 0.2% |

Tabelle 3.3.2b_MB Wöchentliche Passivrauchexposition (in Stunden) von Schüler/innen, Studierenden und Berufstätigen in der Schule oder bei der Arbeit – Total und nach Rauchstatus

| | Schüler | | | Studierende | | | Berufstätige | | |
|----------------------|---------|------------|---------|-------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
| | Total | Tägl./Gel. | Ex-/Nie | Total | Tägl./Gel. | Ex-/Nie | Total | Tägl./Gel. | Ex-/Nie |
| <i>n</i> ungewichtet | 70 | 10 | 60 | 1061 | 235 | 826 | 2706 | 794 | 1912 |
| <i>n</i> gewichtet | 24 | 4 | 20 | 481 | 108 | 373 | 3121 | 844 | 2277 |
| 0 h | 86.0% | 78.6% | 88.1% | 67.7% | 60.5% | 69.7% | 83.9% | 79.8% | 85.4% |
| < 1 h | 4.9% | 0.0% | 5.8% | 18.2% | 16.1% | 18.9% | 9.0% | 10.2% | 8.5% |
| 1-2 h | 2.3% | 0.0% | 2.7% | 9.5% | 14.1% | 8.1% | 4.0% | 5.6% | 3.5% |
| 3-6 h | 6.2% | 21.4% | 3.4% | 3.8% | 8.5% | 2.4% | 1.8% | 2.4% | 1.6% |
| mehr als 6 h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.3% | 2.0% | 1.0% |

3.3.2 Meinungen zum Thema Passivrauchen

Tabelle 3.3.3a_MB Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 2081 | 2891 | 3803 | 942 | 227 | 4972 |
| <i>n gewichtet</i> | 2413 | 2588 | 3629 | 1159 | 212 | 5001 |
| sehr dafür | 58.9% | 69.2% | 60.8% | 70.7% | 87.5% | 64.2% |
| eher dafür | 23.2% | 21.6% | 24.1% | 19.1% | 10.8% | 22.4% |
| eher nicht dafür | 10.0% | 5.6% | 9.1% | 4.9% | 1.3% | 7.8% |
| gar nicht dafür | 7.8% | 3.6% | 6.0% | 5.3% | 0.5% | 5.6% |

Tabelle 3.3.3b_MB Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 915 | 625 | 800 | 542 | 503 | 581 | 575 | 431 | 4972 |
| <i>n gewichtet</i> | 347 | 402 | 686 | 1018 | 927 | 683 | 569 | 369 | 5001 |
| sehr dafür | 58.1% | 53.1% | 67.6% | 69.9% | 67.4% | 59.9% | 65.1% | 59.0% | 64.2% |
| eher dafür | 33.2% | 32.3% | 22.8% | 19.8% | 20.4% | 22.1% | 16.3% | 22.3% | 22.4% |
| eher nicht dafür | 6.1% | 10.1% | 6.6% | 5.2% | 7.4% | 8.2% | 10.8% | 10.9% | 7.8% |
| gar nicht dafür | 2.5% | 4.6% | 3.0% | 5.1% | 4.7% | 9.7% | 7.7% | 7.8% | 5.6% |

Tabelle 3.3.3c_MB Meinung zum 2010 eingeführten generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende | Ex-Rauchende | Niemals-Rauchende | Tägl. oder Gelegenheits-rauchende | Ex- und Niemals-Rauchende | Total |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| <i>n ungewichtet</i> | 862 | 357 | 946 | 2800 | 1219 | 3746 | 4965 |
| <i>n gewichtet</i> | 842 | 344 | 1163 | 2645 | 1185 | 3808 | 4993 |
| sehr dafür | 33.6% | 46.3% | 67.9% | 74.8% | 37.3% | 72.7% | 64.3% |
| eher dafür | 32.8% | 35.9% | 17.7% | 19.2% | 33.7% | 18.8% | 22.3% |
| eher nicht dafür | 18.5% | 9.2% | 8.4% | 3.9% | 15.8% | 5.2% | 7.7% |
| gar nicht dafür | 15.1% | 8.7% | 6.0% | 2.1% | 13.3% | 3.3% | 5.6% |

Tabelle 3.3.4a_MB Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 2079 | 2854 | 3766 | 944 | 223 | 4933 |
| <i>n gewichtet</i> | 2389 | 2552 | 3572 | 1159 | 209 | 4941 |
| ja | 61.6% | 61.3% | 60.9% | 61.0% | 73.1% | 61.4% |
| eher ja | 32.5% | 33.3% | 33.0% | 34.2% | 23.3% | 32.9% |
| eher nicht | 4.7% | 4.2% | 5.1% | 2.7% | 2.6% | 4.4% |
| nein, gar nicht | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 2.1% | 1.0% | 1.3% |

Tabelle 3.3.4b_MB Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 932 | 630 | 802 | 540 | 492 | 574 | 564 | 399 | 4933 |
| <i>n gewichtet</i> | 353 | 405 | 682 | 1015 | 908 | 677 | 560 | 342 | 4941 |
| ja | 43.8% | 48.6% | 58.5% | 67.7% | 61.9% | 70.2% | 61.5% | 63.2% | 61.4% |
| eher ja | 41.7% | 40.5% | 34.9% | 30.1% | 33.5% | 26.0% | 32.9% | 31.1% | 32.9% |
| eher nicht | 13.3% | 9.3% | 4.7% | 1.6% | 3.1% | 2.7% | 3.8% | 5.2% | 4.4% |
| nein, gar nicht | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 0.5% | 1.5% | 1.1% | 1.8% | 0.5% | 1.3% |

Tabelle 3.3.4c_MB Meinung, inwieweit das 2010 eingeführte generelle Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Restaurants, Cafés und Bars eingehalten wird – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich- Rauchende | Gelegenheits- rauchende | Ex- Rauchende | Niemals- Rauchende | Tägl.- oder Gelegenheits- rauchende | Ex- und Niemals- Rauchende | Total |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------|
| | <i>n ungewichtet</i> | 862 | 355 | 937 | 2770 | 1217 | |
| <i>n gewichtet</i> | 840 | 341 | 1152 | 2598 | 1181 | 3750 | 4931 |
| ja | 69.5% | 62.9% | 62.2% | 58.2% | 67.6% | 59.5% | 61.4% |
| eher ja | 24.3% | 32.1% | 33.5% | 35.5% | 26.5% | 34.9% | 32.9% |
| eher nicht | 4.9% | 4.2% | 3.1% | 4.9% | 4.7% | 4.3% | 4.4% |
| nein, gar nicht | 1.3% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |

Tabelle 3.3.5a_MB Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 2060 | 2877 | 3776 | 939 | 222 | 4937 |
| <i>n gewichtet</i> | 2374 | 2575 | 3590 | 1150 | 208 | 4949 |
| totales Rauchverbot, ohne Ausnahme und OHNE Raucherräume | 18.3% | 17.8% | 17.6% | 16.5% | 34.7% | 18.0% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen, aber OHNE Bedienung | 39.2% | 42.8% | 39.8% | 45.9% | 36.2% | 41.1% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen und mit Bedienung | 42.5% | 39.4% | 42.6% | 37.6% | 29.1% | 40.9% |

Tabelle 3.3.5b_MB Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 933 | 633 | 798 | 540 | 498 | 563 | 568 | 404 | 4937 |
| <i>n gewichtet</i> | 353 | 406 | 684 | 1014 | 915 | 664 | 562 | 350 | 4949 |
| totales Rauchverbot, ohne Ausnahme und OHNE Raucherräume | 11.7% | 14.0% | 15.7% | 17.6% | 19.6% | 17.3% | 21.9% | 26.1% | 18.0% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen, aber OHNE Bedienung | 44.6% | 42.3% | 45.2% | 42.2% | 43.7% | 34.5% | 39.6% | 33.2% | 41.1% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen und mit Bedienung | 43.7% | 43.8% | 39.1% | 40.2% | 36.8% | 48.2% | 38.5% | 40.7% | 40.9% |

Tabelle 3.3.5c_MB Präferenzen bezüglich anderer allfälliger Regelungen – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich- Rauchende | Gelegen- heits- rauchende | Ex- Rauchende | Niemals- Rauchende | Tägl.- oder Gelegenheits- rauchende | Ex- und Niemals- Rauchende | Total |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------|
| | <i>n ungewichtet</i> | 856 | 355 | 939 | 2779 | 1211 | |
| <i>n gewichtet</i> | 836 | 338 | 1157 | 2610 | 1173 | 3767 | 4940 |
| totales Rauchverbot, ohne Ausnahme und OHNE Raucherräume | 12.9% | 11.0% | 17.7% | 20.8% | 12.4% | 19.8% | 18.1% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen, aber OHNE Bedienung | 33.5% | 37.0% | 42.1% | 43.6% | 34.5% | 43.1% | 41.1% |
| totales Rauchverbot, mit Raucherräumen und mit Bedienung | 53.6% | 51.9% | 40.2% | 35.6% | 53.1% | 37.0% | 40.9% |

3.3.3 Passivrauchen am Arbeitsplatz

Tabelle 3.3.6a_MB Kenntnis vom Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Nichtraucherenden vor Passivrauchen bei der Arbeit (nur Erwerbstätige) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 1260 | 1488 | 2169 | 482 | 97 | 2748 |
| <i>n</i> gewichtet | 1666 | 1511 | 2336 | 734 | 107 | 3177 |
| ja | 68.0% | 64.8% | 67.6% | 62.1% | 71.6% | 66.5% |
| nein | 19.6% | 20.8% | 22.3% | 14.8% | 11.4% | 20.2% |
| weiss nicht | 12.4% | 14.4% | 10.1% | 23.1% | 17.1% | 13.3% |

Tabelle 3.3.6b_MB Kenntnis vom Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Nichtraucherenden vor Passivrauchen bei der Arbeit (nur Erwerbstätige) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 363 | 379 | 666 | 478 | 425 | 390 | 40 | 7 | 2748 |
| <i>n</i> gewichtet | 138 | 242 | 582 | 896 | 780 | 499 | 34 | 6 | 3177 |
| ja | 46.3% | 54.6% | 63.9% | 70.1% | 69.3% | 69.3% | 77.0% | 60.0% | 66.5% |
| nein | 37.6% | 33.1% | 23.4% | 17.8% | 17.1% | 15.2% | 10.5% | 0.0% | 20.2% |
| weiss nicht | 16.1% | 12.3% | 12.7% | 12.1% | 13.6% | 15.5% | 12.5% | 40.0% | 13.3% |

Tabelle 3.3.6c_MB Kenntnis vom Vorhandensein gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Nichtraucherenden vor Passivrauchen bei der Arbeit (nur Erwerbstätige) – Total und nach Expositionszeit bei der Arbeit

| | Exposition bei der Arbeit | | | | | Total |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| | nein | < 1h | 1-2 h | 3-6 h | mehr als 6h | |
| <i>n</i> ungewichtet | 2223 | 264 | 139 | 64 | 47 | 2737 |
| <i>n</i> gewichtet | 2656 | 285 | 129 | 57 | 40 | 3167 |
| Ja | 67.0% | 69.0% | 59.0% | 57.1% | 52.3% | 66.5% |
| Nein | 18.6% | 26.1% | 33.2% | 29.2% | 26.0% | 20.1% |
| Weiss nicht | 14.4% | 4.9% | 7.8% | 13.8% | 21.7% | 13.4% |

Tabelle 3.3.7a_MB Geltende Raucherregelungen bei der Arbeit an geschlossenen Orten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion (nur Erwerbstätige)

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 1239 | 1460 | 2140 | 470 | 89 | 2699 |
| <i>n gewichtet</i> | 1639 | 1484 | 2303 | 721 | 99 | 3123 |
| Rauchen allgemein erlaubt | 4.2% | 2.1% | 3.3% | 2.9% | 4.8% | 3.2% |
| Rauchen erlaubt ausser in Nichtraucherzonen | 4.2% | 2.6% | 3.8% | 2.0% | 5.1% | 3.4% |
| Rauchverbot ausser in Raucherzonen | 19.7% | 17.8% | 20.1% | 14.6% | 19.1% | 18.8% |
| allgemeines Rauchverbot | 64.6% | 71.0% | 65.8% | 73.5% | 68.2% | 67.7% |
| keine Regelung | 7.3% | 6.5% | 7.0% | 7.0% | 2.9% | 6.9% |

Tabelle 3.3.7b_MB Geltende Raucherregelungen bei der Arbeit an geschlossenen Orten – Total und nach Alter (nur Erwerbstätige)

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 352 | 376 | 653 | 471 | 416 | 386 | 38 | 7 | 2699 |
| <i>n gewichtet</i> | 132 | 240 | 568 | 885 | 765 | 493 | 33 | 6 | 3123 |
| Rauchen allgemein erlaubt | 7.3% | 6.0% | 2.0% | 2.2% | 3.8% | 2.9% | 2.0% | 14.3% | 3.2% |
| Rauchen erlaubt ausser in Nichtraucherzonen | 7.7% | 4.3% | 3.1% | 3.8% | 1.7% | 3.9% | 7.4% | 9.4% | 3.4% |
| Rauchverbot ausser in Raucherzonen | 15.7% | 22.6% | 18.8% | 20.7% | 17.0% | 16.9% | 25.1% | 0.0% | 18.8% |
| allgemeines Rauchverbot | 64.2% | 61.2% | 71.2% | 68.0% | 69.2% | 65.1% | 63.3% | 50.8% | 67.7% |
| keine Regelung | 5.2% | 5.9% | 4.9% | 5.3% | 8.2% | 11.2% | 2.2% | 25.6% | 6.9% |

3.3.4 Passivrauchen in der Wohnung

Tabelle 3.3.8_MB Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – nach Rauchstatus

| | Rauchende | | Total |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheitsrauchernde | |
| <i>n ungewichtet</i> | 875 | 359 | 1234 |
| <i>n gewichtet</i> | 853 | 344 | 1197 |
| täglich | 30.2% | 0.6% | 21.7% |
| mehrmals pro Woche | 3.6% | 4.2% | 3.8% |
| einmal pro Woche | 1.8% | 2.3% | 1.9% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 1.9% | 5.7% | 3.0% |
| weniger als einmal pro Monat | 1.7% | 3.5% | 2.2% |
| nie | 60.9% | 83.7% | 67.4% |

Tabelle 3.3.9a_MB Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion (alle Rauchenden)

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 593 | 643 | 908 | 269 | 59 | 1236 |
| <i>n gewichtet</i> | 653 | 547 | 844 | 312 | 45 | 1200 |
| täglich | 20.3% | 23.4% | 16.4% | 34.1% | 36.0% | 21.7% |
| mehrmals pro Woche | 3.5% | 4.1% | 3.0% | 5.4% | 5.6% | 3.7% |
| einmal pro Woche | 1.3% | 2.7% | 2.0% | 1.6% | 2.8% | 1.9% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 4.9% | 0.0% | 3.0% |
| weniger als einmal pro Monat | 2.0% | 2.5% | 2.7% | 0.9% | 2.5% | 2.2% |
| nie | 69.8% | 64.5% | 73.4% | 53.1% | 53.1% | 67.4% |

Tabelle 3.3.9b_MB Konsumhäufigkeit (der Befragten) in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Alter (alle Rauchenden)

| | Alter | | | | | | | | Total |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 209 | 211 | 254 | 140 | 138 | 138 | 102 | 44 | 1236 |
| <i>n gewichtet</i> | 77 | 137 | 195 | 263 | 227 | 163 | 98 | 39 | 1200 |
| täglich | 6.2% | 14.6% | 21.7% | 12.7% | 22.4% | 38.7% | 30.9% | 41.7% | 21.7% |
| mehrmals pro Woche | 3.2% | 3.0% | 1.4% | 3.1% | 5.9% | 4.4% | 6.3% | 1.7% | 3.7% |
| einmal pro Woche | 3.3% | 2.4% | 2.9% | 1.6% | 1.2% | 1.7% | 1.4% | 1.7% | 1.9% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 3.8% | 1.3% | 1.8% | 3.2% | 5.3% | 0.0% | 5.2% | 4.1% | 3.0% |
| weniger als einmal pro Monat | 3.3% | 3.5% | 1.8% | 0.7% | 1.3% | 3.1% | 5.0% | 2.1% | 2.2% |
| nie | 80.2% | 75.1% | 70.4% | 78.7% | 63.8% | 52.1% | 51.2% | 48.8% | 67.4% |

Tabelle 3.3.10a_MB Konsumhäufigkeit einer anderen Person in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 2115 | 2947 | 3886 | 946 | 230 | 5062 |
| <i>n gewichtet</i> | 2437 | 2625 | 3688 | 1159 | 215 | 5062 |
| täglich | 3.8% | 4.1% | 2.5% | 8.2% | 6.5% | 4.0% |
| mehrmals pro Woche | 1.3% | 0.6% | 0.4% | 2.0% | 4.2% | 1.0% |
| einmal pro Woche | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 2.6% | 2.5% | 1.9% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 2.9% | 2.7% | 2.5% | 4.0% | 1.4% | 2.8% |
| weniger als einmal pro Monat | 4.4% | 4.3% | 3.9% | 5.9% | 4.5% | 4.4% |
| nie | 85.6% | 86.4% | 89.1% | 77.4% | 80.8% | 86.1% |

Tabelle 3.3.10b_MB Konsumhäufigkeit einer anderen Person in der Wohnung (Präzisierung: nicht auf Balkon oder Terrasse) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 936 | 630 | 806 | 542 | 508 | 587 | 588 | 465 | 5062 |
| <i>n gewichtet</i> | 354 | 405 | 690 | 1017 | 932 | 689 | 579 | 398 | 5062 |
| täglich | 7.8% | 10.6% | 3.6% | 2.2% | 4.1% | 3.2% | 3.4% | 0.6% | 4.0% |
| mehrmals pro Woche | 1.5% | 2.0% | 1.0% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| einmal pro Woche | 2.2% | 2.1% | 4.3% | 0.8% | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 2.0% | 1.9% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 3.2% | 1.6% | 3.3% | 2.1% | 3.9% | 2.4% | 2.4% | 3.4% | 2.8% |
| weniger als einmal pro Monat | 3.8% | 5.1% | 3.7% | 3.5% | 4.6% | 6.1% | 5.3% | 2.5% | 4.4% |
| nie | 81.6% | 78.7% | 84.2% | 90.0% | 85.2% | 86.2% | 87.3% | 90.7% | 86.1% |

Tabelle 3.3.11a_MB Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 2117 | 2950 | 3891 | 946 | 230 | 5067 |
| <i>n gewichtet</i> | 2439 | 2631 | 3693 | 1162 | 215 | 5070 |
| täglich | 1.1% | 1.0% | 0.4% | 2.9% | 1.4% | 1.0% |
| mehrmals pro Woche | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.3% |
| einmal pro Woche | 1.1% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.2% | 0.8% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 0.6% | 0.5% |
| weniger als einmal pro Monat | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 1.1% | 1.4% |
| nie | 95.1% | 96.7% | 97.1% | 92.0% | 96.5% | 95.9% |

Tabelle 3.3.11b_MB Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 937 | 630 | 806 | 544 | 509 | 588 | 588 | 465 | 5067 |
| <i>n gewichtet</i> | 354 | 404 | 690 | 1021 | 934 | 690 | 579 | 398 | 5070 |
| täglich | 3.8% | 2.7% | 0.5% | 0.6% | 1.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 1.0% |
| mehrmals pro Woche | 0.9% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
| einmal pro Woche | 1.7% | 1.3% | 2.9% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.8% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 1.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.1% | 0.5% |
| weniger als einmal pro Monat | 1.2% | 2.1% | 0.8% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 0.5% | 0.9% | 1.4% |
| nie | 91.0% | 93.0% | 95.3% | 96.7% | 95.3% | 97.4% | 97.7% | 98.9% | 95.9% |

Tabelle 3.3.11c_MB Konsumhäufigkeit in der Wohnung der Befragten im Beisein von Kindern oder Jugendlichen – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende | Ex-Rauchende | Niemals-Rauchende | Total |
|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------|
| <i>n</i> ungewichtet | 873 | 359 | 967 | 2859 | 5058 |
| <i>n</i> gewichtet | 852 | 344 | 1182 | 2682 | 5060 |
| täglich | 2.5% | 1.7% | 0.5% | 0.7% | 1.0% |
| mehrmals pro Woche | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| einmal pro Woche | 2.4% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 0.8% |
| ein- bis dreimal pro Monat | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
| weniger als einmal pro Monat | 2.2% | 0.5% | 1.8% | 1.2% | 1.4% |
| nie | 90.6% | 96.2% | 97.1% | 97.0% | 95.9% |

3.3.5 Tabakkonsum im nächsten Umfeld

Tabelle 3.3.12a_MB Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 2112 | 2949 | 3882 | 952 | 227 | 5061 |
| <i>n</i> gewichtet | 2426 | 2627 | 3678 | 1163 | 212 | 5054 |
| eine | 22.9% | 26.5% | 24.2% | 26.2% | 26.3% | 24.8% |
| zwei | 16.9% | 15.6% | 17.1% | 13.5% | 16.6% | 16.2% |
| drei | 7.6% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | 8.5% | 8.1% |
| vier | 3.3% | 2.7% | 2.9% | 3.2% | 3.1% | 3.0% |
| fünf | 4.4% | 3.5% | 3.9% | 3.9% | 4.9% | 3.9% |
| keine | 44.9% | 43.1% | 43.9% | 44.9% | 40.5% | 44.0% |

Tabelle 3.3.12b_MB Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 940 | 635 | 806 | 542 | 509 | 587 | 582 | 460 | 5061 |
| <i>n</i> gewichtet | 356 | 408 | 683 | 1017 | 934 | 690 | 574 | 392 | 5054 |
| eine | 22.4% | 22.6% | 26.0% | 30.1% | 23.6% | 24.3% | 23.3% | 19.0% | 24.8% |
| zwei | 21.3% | 23.8% | 18.9% | 12.6% | 19.4% | 14.5% | 10.7% | 12.1% | 16.2% |
| drei | 9.6% | 14.2% | 9.2% | 9.9% | 8.0% | 6.0% | 4.5% | 2.9% | 8.1% |
| vier | 5.8% | 8.1% | 4.3% | 2.4% | 1.3% | 2.3% | 1.8% | 1.1% | 3.0% |
| fünf | 8.8% | 6.7% | 6.3% | 1.9% | 3.5% | 4.4% | 2.5% | 0.2% | 3.9% |
| keine | 32.0% | 24.7% | 35.3% | 43.0% | 44.2% | 48.6% | 57.4% | 64.7% | 44.0% |

Tabelle 3.3.12c_MB Anzahl Rauchende unter den fünf Personen im nächsten Umfeld der Befragten – Total und nach Rauchstatus

| | Rauchstatus | | | | Total |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende | Ex-Rauchende | Niemals-Rauchende | |
| <i>n ungewichtet</i> | 871 | 358 | 965 | 2858 | 5052 |
| <i>n gewichtet</i> | 844 | 342 | 1176 | 2682 | 5044 |
| eine | 16.5% | 32.1% | 26.8% | 25.6% | 24.8% |
| zwei | 21.8% | 18.0% | 18.1% | 13.5% | 16.3% |
| drei | 19.2% | 10.8% | 5.6% | 5.4% | 8.1% |
| vier | 9.5% | 4.3% | 2.3% | 1.1% | 3.0% |
| fünf | 13.9% | 7.0% | 2.2% | 1.2% | 3.9% |
| keine | 19.1% | 27.8% | 45.0% | 53.3% | 43.9% |

3.4 Entwöhnung

3.4.1 Wunsch und Absicht aufzuhören

Tabelle 3.4.1_MB Aufhörwunsch – nach Rauchstatus*

| | Rauchende | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende |
| <i>n ungewichtet</i> | 839 | 180 |
| <i>n gewichtet</i> | 808 | 194 |
| Ja | 56.0% | 24.5% |
| Nein | 44.0% | 75.5% |

Anmerkung: *Gelegenheitsraucher: nur für den Zeitraum Juli-Dezember erhobene Daten.

Tabelle 3.4.2a_MB Aufhörwunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 392 | 447 | 608 | 190 | 41 | 839 |
| <i>n gewichtet</i> | 420 | 387 | 551 | 226 | 30 | 808 |
| Ja | 57.6% | 54.3% | 54.4% | 58.7% | 66.0% | 56.0% |
| Nein | 42.4% | 45.7% | 45.6% | 41.3% | 34.0% | 44.0% |

Tabelle 3.4.2b_MB Aufhörwunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 119 | 143 | 176 | 102 | 99 | 106 | 67 | 27 | 839 |
| <i>n gewichtet</i> | 45 | 90 | 142 | 171 | 154 | 120 | 64 | 21 | 808 |
| Ja | 52.5% | 52.5% | 67.9% | 62.9% | 49.4% | 49.9% | 55.0% | 28.1% | 56.0% |
| Nein | 47.5% | 47.5% | 32.1% | 37.1% | 50.6% | 50.1% | 45.0% | 71.9% | 44.0% |

Aufhörabsicht innerhalb von 6 Monaten und innerhalb von 30 Tagen

Tabelle 3.4.3a_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 568 | 589 | 853 | 251 | 53 | 1157 |
| <i>n</i> gewichtet | 617 | 507 | 799 | 284 | 40 | 1124 |
| Ja | 26.7% | 28.8% | 26.9% | 29.2% | 30.2% | 27.6% |
| Nein | 73.3% | 71.2% | 73.1% | 70.8% | 69.8% | 72.4% |

Tabelle 3.4.3b_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 198 | 206 | 237 | 136 | 128 | 121 | 93 | 38 | 1157 |
| <i>n</i> gewichtet | 74 | 134 | 182 | 249 | 212 | 149 | 91 | 34 | 1124 |
| Ja | 26.9% | 28.2% | 33.7% | 31.7% | 26.4% | 23.3% | 20.4% | 9.7% | 27.6% |
| Nein | 73.1% | 71.8% | 66.3% | 68.3% | 73.6% | 76.7% | 79.6% | 90.3% | 72.4% |

Tabelle 3.4.3c_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 6 Monate (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Rauchstatus*

| | Rauchende | | Total |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheitsraucher | |
| <i>n</i> ungewichtet | 816 | 339 | 1155 |
| <i>n</i> gewichtet | 796 | 326 | 1121 |
| Ja | 29.8% | 22.4% | 27.7% |
| Nein | 70.2% | 77.6% | 72.3% |

Tabelle 3.4.4a_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 562 | 578 | 840 | 247 | 53 | 1140 |
| <i>n</i> gewichtet | 605 | 496 | 780 | 281 | 40 | 1101 |
| Ja | 7.3% | 9.1% | 7.2% | 10.0% | 11.6% | 8.1% |
| Nein | 92.7% | 90.9% | 92.8% | 90.0% | 88.4% | 91.9% |

Tabelle 3.4.4b_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | Total | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | | 75+ |
| <i>n ungewichtet</i> | 195 | 204 | 233 | 135 | 126 | 119 | 91 | 37 | 1140 |
| <i>n gewichtet</i> | 73 | 133 | 173 | 248 | 205 | 147 | 88 | 33 | 1101 |
| Ja | 7.4% | 7.1% | 9.6% | 11.4% | 9.1% | 3.5% | 6.0% | 0.0% | 8.1% |
| Nein | 92.6% | 92.9% | 90.4% | 88.6% | 90.9% | 96.5% | 94.0% | 100.0% | 91.9% |

Tabelle 3.4.4c_MB *Aufhörabsicht innerhalb der nächsten 30 Tage (Täglich- und Gelegenheitsraucher) – Total und nach Rauchstatus*

| | Rauchende | | Total |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheitsraucher | |
| <i>n ungewichtet</i> | 800 | 338 | 1138 |
| <i>n gewichtet</i> | 773 | 326 | 1098 |
| Ja | 7.2% | 10.2% | 8.1% |
| Nein | 92.8% | 89.8% | 91.9% |

Aufhörbereitschaft im Überblick

Tabelle 3.4.5a_MB *Aufhörbereitschaft der Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 397 | 458 | 618 | 195 | 42 | 855 |
| <i>n gewichtet</i> | 429 | 401 | 564 | 233 | 33 | 830 |
| Problemignorierende (denken nicht ans Aufhören) | 38.2% | 43.0% | 42.5% | 36.9% | 31.6% | 40.5% |
| Ambivalente (wissen nicht, ob sie aufhören möchten) | 0.6% | 3.3% | 1.8% | 1.5% | 7.1% | 1.9% |
| Präkontemplation A (geplanter Rauchstopp > 6 Monaten) | 26.1% | 19.9% | 21.4% | 27.3% | 22.9% | 23.1% |
| Präkontemplation B (möchten aufhören, wissen aber nicht wann) | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 6.7% | 7.9% | 5.8% |
| Kontemplation (Rauchstopp in 1 bis 6 Monaten) | 22.4% | 21.4% | 22.7% | 20.2% | 19.7% | 21.9% |
| Präparation (Rauchstopp innerhalb von 30 Tagen) | 6.7% | 6.7% | 6.2% | 7.4% | 10.8% | 6.7% |

Tabelle 3.4.5b_MB *Aufhörerbereitschaft der Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 120 | 145 | 177 | 105 | 100 | 110 | 70 | 28 | 855 |
| <i>n gewichtet</i> | 46 | 92 | 144 | 179 | 156 | 126 | 66 | 21 | 830 |
| Problemignorierende (denken nicht ans Aufhören) | 40.8% | 44.0% | 29.9% | 33.3% | 49.8% | 46.2% | 36.2% | 69.7% | 40.5% |
| Ambivalente (wissen nicht, ob sie aufhören möchten) | 0.4% | 1.5% | 0.0% | 4.6% | 1.0% | 1.7% | 3.0% | 3.0% | 1.9% |
| Präkontemplation A (geplanter Rauchstopp in > 6 Monaten) | 28.8% | 21.8% | 32.6% | 24.7% | 16.4% | 19.2% | 23.9% | 8.9% | 23.1% |
| Präkontemplation B (möchten aufhören, wissen aber nicht wann) | 3.3% | 3.4% | 6.2% | 3.9% | 8.1% | 6.9% | 8.7% | 3.2% | 5.8% |
| Kontemplation (Rauchstopp in 1 bis 6 Monaten) | 21.1% | 24.5% | 25.9% | 23.1% | 16.7% | 22.5% | 20.1% | 15.2% | 21.9% |
| Präparation (Rauchstopp innerhalb von 30 Tagen) | 5.7% | 4.9% | 5.4% | 10.3% | 8.0% | 3.5% | 8.1% | 0.0% | 6.7% |

Tabelle 3.4.6a_MB *Aufhörerbereitschaft der Gelegenheitsrauchenden* – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 82 | 100 | 143 | 33 | 6 | 182 |
| <i>n gewichtet</i> | 108 | 86 | 145 | 46 | 3 | 195 |
| Problemignorierende (denken nicht ans Aufhören) | 74.2% | 66.4% | 68.7% | 76.7% | 79.2% | 70.7% |
| Ambivalente (wissen nicht, ob sie aufhören möchten) | 0.3% | 1.6% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.9% |
| Präkontemplation A (geplanter Rauchstopp in > 6 Monaten) | 8.9% | 7.2% | 10.4% | 1.5% | 0.0% | 8.1% |
| Präkontemplation B (möchten aufhören, wissen aber nicht wann) | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 10.4% | 0.4% |
| Kontemplation (Rauchstopp in 1 bis 6 Monaten) | 10.1% | 14.7% | 13.0% | 9.6% | 10.4% | 12.1% |
| Präparation (Rauchstopp innerhalb von 30 Tagen) | 5.8% | 10.2% | 6.6% | 11.7% | 0.0% | 7.7% |

Anmerkung: *Gelegenheitsrauchende: nur für den Zeitraum Juli-Dezember erhobene Daten.

Tabelle 3.4.6b_MB *Aufhörerbereitschaft der Gelegenheitsrauchenden* – Total und nach Alter**

| | Alter | | | | | | | | Total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 42 | 33 | 38 | 19 | 15 | 15 | 17 | 3 | 182 |
| <i>n gewichtet</i> | 14 | 23 | 28 | 56 | 33 | 23 | 16 | 3 | 195 |
| Problemignorierende (denken nicht ans Aufhören) | 66.6% | 55.7% | 55.5% | 85.3% | 70.7% | 55.8% | 87.3% | 100.0% | 70.7% |
| Ambivalente (wissen nicht, ob sie aufhören möchten) | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 0.9% |
| Präkontemplation A (geplanter Rauchstopp in > 6 Monaten) | 4.7% | 6.1% | 6.5% | 5.7% | 0.0% | 35.9% | 4.1% | 0.0% | 8.1% |
| Präkontemplation B (möchten aufhören, wissen aber nicht wann) | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| Kontemplation (Rauchstopp in 1 bis 6 Monaten) | 16.9% | 23.8% | 15.1% | 3.8% | 25.6% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 12.1% |
| Präparation (Rauchstopp innerhalb von 30 Tagen) | 9.5% | 14.5% | 20.3% | 5.2% | 3.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |

Anmerkung: *Gelegenheitsrauchende: nur für den Zeitraum Juli-Dezember erhobene Daten.
Keine Angaben in der Altersgruppe 75+ infolge zu geringer Anzahl an Befragten.

3.4.2 Reduktionswunsch

Tabelle 3.4.7a_MB *Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 410 | 456 | 627 | 194 | 45 | 866 |
| <i>n gewichtet</i> | 441 | 400 | 574 | 232 | 35 | 841 |
| Ja | 63.7% | 67.0% | 62.5% | 71.4% | 69.2% | 65.2% |
| Nein | 36.3% | 33.0% | 37.5% | 28.6% | 30.8% | 34.8% |

Tabelle 3.4.7b_MB *Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 120 | 145 | 174 | 103 | 100 | 114 | 75 | 35 | 866 |
| <i>n gewichtet</i> | 46 | 92 | 140 | 175 | 155 | 131 | 72 | 29 | 841 |
| Ja | 65.2% | 64.5% | 66.4% | 72.1% | 67.7% | 61.1% | 60.5% | 37.5% | 65.2% |
| Nein | 34.8% | 35.5% | 33.6% | 27.9% | 32.3% | 38.9% | 39.5% | 62.5% | 34.8% |

Tabelle 3.4.7c_MB Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – nach Anzahl Jahren seit Beginn des täglichen Konsums (nur Zigarettenraucher)

| | Anz. Jahre seit Beginn des täglichen Konsums | | | | | Total |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 208 | 144 | 139 | 111 | 259 | 861 |
| <i>n gewichtet</i> | 108 | 93 | 161 | 185 | 291 | 838 |
| Ja | 60.6% | 67.8% | 74.0% | 71.2% | 57.4% | 65.2% |
| Nein | 39.4% | 32.2% | 26.0% | 28.8% | 42.6% | 34.8% |

Tabelle 3.4.7d_MB Reduktionswunsch bei den Täglich-Rauchenden – Total und nach Zigarettenkonsum pro Tag (nur Zigarettenraucher)

| | Anz. gerauchter Zigaretten pro Tagt | | | | Total |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 127 | 293 | 351 | 57 | 828 |
| <i>n gewichtet</i> | 100 | 255 | 371 | 70 | 796 |
| Ja | 44.0% | 70.6% | 73.4% | 50.3% | 66.8% |
| Nein | 56.0% | 29.4% | 26.6% | 49.7% | 33.2% |

Tabelle 3.4.8_MB Reduktionswunsch bei den Gelegenheitsrauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 82 | 101 | 143 | 34 | 6 | 183 |
| <i>n gewichtet</i> | 108 | 88 | 145 | 47 | 3 | 196 |
| Ja | 28.5% | 40.5% | 34.4% | 32.2% | 35.4% | 33.9% |
| Nein | 71.5% | 59.5% | 65.6% | 67.8% | 64.6% | 66.1% |

Anmerkung: *Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

3.4.3 Rat zum Rauchstopp und für kommenden Aufhörversuch erwogene Entwöhnungshilfen

Tabelle 3.4.9a_MB Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 414 | 462 | 636 | 195 | 45 | 876 |
| <i>n</i> gewichtet | 450 | 405 | 586 | 233 | 35 | 855 |
| Ja | 50.9% | 53.1% | 49.6% | 56.9% | 58.2% | 51.9% |
| Nein | 49.1% | 46.9% | 50.4% | 43.1% | 41.8% | 48.1% |

Tabelle 3.4.9b_MB Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 120 | 145 | 177 | 106 | 101 | 116 | 76 | 35 | 876 |
| <i>n</i> gewichtet | 46 | 92 | 144 | 182 | 157 | 133 | 73 | 29 | 855 |
| Ja | 76.1% | 72.1% | 54.7% | 58.9% | 44.0% | 42.4% | 35.5% | 20.1% | 51.9% |
| Nein | 23.9% | 27.9% | 45.3% | 41.1% | 56.0% | 57.6% | 64.5% | 79.9% | 48.1% |

Tabelle 3.4.10a_MB Zum Rauchstopp ratende Person (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 231 | 256 | 335 | 124 | 28 | 487 |
| <i>n</i> gewichtet | 225 | 211 | 283 | 133 | 20 | 436 |
| Arzt/Ärztin | 23.6% | 24.7% | 24.2% | 20.4% | 48.2% | 24.1% |
| Zahnarzt/Zahnärztin | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 2.9% | 0.0% | 2.2% |
| Apotheker/in | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| anderes Gesundheitspersonal | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 0.0% | 0.6% |
| Partner/in oder Familienmitglied(er) | 56.2% | 61.1% | 55.9% | 67.0% | 40.5% | 58.6% |
| Freund/e oder Bekannte | 36.7% | 40.0% | 37.0% | 40.6% | 42.0% | 38.3% |
| andere Person(en) | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.3% |

Tabelle 3.4.10b_MB Zum Rauchstopp ratende Person (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 92 | 99 | 111 | 63 | 43 | 46 | 26 | 7 | 487 |
| <i>n</i> gewichtet | 35 | 65 | 77 | 107 | 66 | 55 | 26 | 6 | 436 |
| Arzt/Ärztin | 9.0% | 10.2% | 17.2% | 28.4% | 30.9% | 37.3% | 31.1% | 51.3% | 24.1% |
| Zahnarzt/Zahnärztin | 0.0% | 1.3% | 3.6% | 3.3% | 2.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| Apotheker/in | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| anderes Gesundheitspersonal | 2.4% | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| Partner/in oder Familienmitglied(er) | 65.9% | 59.1% | 78.6% | 52.7% | 53.5% | 53.5% | 38.1% | 49.2% | 58.6% |
| Freund/e oder Bekannte | 60.0% | 51.4% | 24.2% | 40.0% | 37.1% | 33.5% | 30.8% | 11.3% | 38.3% |
| andere Person(en) | 0.4% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |

Tabelle 3.4.11_MB Rat zum Rauchstopp in den letzten 12 Monaten (bei den Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 82 | 101 | 143 | 34 | 6 | 183 |
| <i>n</i> gewichtet | 108 | 88 | 145 | 47 | 3 | 196 |
| Ja | 19.8% | 32.4% | 25.8% | 24.5% | 24.6% | 25.5% |
| Nein | 80.2% | 67.6% | 74.2% | 75.5% | 75.4% | 74.5% |

Anmerkung: *Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Erwogene Entwöhnungshilfen für einen kommenden Aufhörversuch

Tabelle 3.4.12a_MB Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp in den nächsten 6 Monaten erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 146 | 158 | 217 | 70 | 17 | 304 |
| <i>n</i> gewichtet | 160 | 140 | 209 | 78 | 12 | 300 |
| medikamentöse Hilfe | 13.9% | 19.0% | 16.8% | 14.7% | 18.1% | 16.3% |
| Unterstützung durch Fachperson | 18.2% | 13.5% | 17.0% | 13.4% | 15.9% | 16.0% |
| Alternativmedizin | 9.1% | 30.6% | 17.0% | 27.5% | 3.2% | 19.1% |
| Motivationsarbeit mit Buch oder Programm | 16.3% | 33.0% | 22.2% | 30.6% | 15.7% | 24.1% |
| andere Hilfe(n) | 0.9% | 5.8% | 3.4% | 2.9% | 1.3% | 3.2% |
| keine besondere Hilfe | 51.9% | 31.3% | 45.6% | 32.6% | 48.9% | 42.3% |

Tabelle 3.4.12b_MB Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp in den nächsten 6 Monaten erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 54 | 51 | 75 | 43 | 37 | 23 | 17 | 4 | 304 |
| <i>n gewichtet</i> | 19 | 37 | 60 | 73 | 55 | 34 | 19 | 3 | 300 |
| medikamentöse Hilfe | 8.7% | 4.9% | 9.2% | 27.3% | 16.1% | 10.9% | 39.3% | 0.0% | 16.3% |
| Unterstützung durch Fachperson | 10.1% | 13.9% | 8.2% | 12.9% | 33.5% | 7.1% | 23.1% | 41.3% | 16.0% |
| Alternativmedizin | 3.0% | 10.1% | 10.7% | 32.3% | 19.8% | 33.9% | 0.0% | 18.5% | 19.1% |
| Motivationsarbeit mit Buch oder Programm | 31.2% | 25.3% | 27.0% | 38.8% | 12.7% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 24.1% |
| andere Hilfe(n) | 11.0% | 6.2% | 4.2% | 3.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| keine besondere Hilfe | 53.2% | 57.8% | 53.6% | 19.6% | 44.8% | 41.9% | 47.9% | 40.2% | 42.3% |

Tabelle 3.4.13a_MB Von Rauchenden mit geplantem Rauchstopp (aber nicht in den nächsten 6 Monaten) erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 97 | 101 | 138 | 49 | 11 | 198 |
| <i>n gewichtet</i> | 119 | 85 | 138 | 59 | 7 | 204 |
| medikamentöse Hilfe | 24.4% | 20.9% | 22.8% | 20.5% | 47.2% | 22.9% |
| Unterstützung durch Fachperson | 19.1% | 13.5% | 17.5% | 16.6% | 2.6% | 16.7% |
| Alternativmedizin | 26.0% | 33.5% | 30.0% | 29.0% | 10.7% | 29.1% |
| Motivationsarbeit mit Buch oder Programm | 18.7% | 18.6% | 16.6% | 25.5% | 0.0% | 18.6% |
| andere Hilfe(n) | 22.9% | 18.2% | 22.2% | 17.0% | 32.1% | 21.0% |
| keine besondere Hilfe | 25.2% | 28.7% | 24.8% | 30.0% | 34.1% | 26.6% |

Tabelle 3.4.13b_MB Von Rauchenden mit Aufhörwunsch (aber nicht in den nächsten 6 Monaten) erwogene Entwöhnungshilfen – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 32 | 35 | 51 | 31 | 17 | 19 | 11 | 2 | 198 |
| <i>n gewichtet</i> | 13 | 21 | 48 | 51 | 26 | 29 | 13 | 2 | 204 |
| medikamentöse Hilfe | 36.8% | 9.3% | 37.1% | 25.2% | 10.4% | 8.6% | 30.8% | 0.0% | 22.9% |
| Unterstützung durch Fachperson | 34.2% | 8.7% | 33.2% | 12.1% | 0.0% | 6.2% | 29.2% | 0.0% | 16.7% |
| Alternativmedizin | 18.7% | 14.5% | 18.8% | 37.5% | 41.1% | 50.8% | 0.0% | 0.0% | 29.1% |
| Motivationsarbeit mit Buch oder Programm | 21.3% | 42.3% | 20.6% | 11.8% | 18.8% | 11.9% | 14.4% | 0.0% | 18.6% |
| andere Hilfe(n) | 25.9% | 20.0% | 39.4% | 18.4% | 17.6% | 0.0% | 8.9% | 55.7% | 21.0% |
| keine besondere Hilfe | 20.4% | 32.8% | 16.2% | 26.6% | 35.4% | 33.0% | 26.9% | 44.3% | 26.6% |

3.4.4 Rauchstopplinie

Tabelle 3.4.14a_MB Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 593 | 640 | 903 | 271 | 59 | 1233 |
| <i>n</i> gewichtet | 654 | 545 | 841 | 314 | 45 | 1199 |
| Ja, ich habe davon gehört | 37.6% | 34.0% | 36.0% | 34.7% | 43.0% | 35.9% |
| Ja, und ich habe schon angerufen | 1.9% | 2.2% | 2.0% | 2.4% | 0.0% | 2.0% |
| Nein | 60.5% | 63.8% | 62.0% | 62.9% | 57.0% | 62.0% |

Tabelle 3.4.14b_MB Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 210 | 212 | 251 | 140 | 137 | 138 | 101 | 44 | 1233 |
| <i>n</i> gewichtet | 78 | 138 | 194 | 263 | 227 | 163 | 98 | 39 | 1199 |
| Ja, ich habe davon gehört | 39.3% | 44.8% | 41.5% | 29.2% | 30.8% | 44.7% | 33.9% | 13.7% | 35.9% |
| Ja, und ich habe schon angerufen | 0.7% | 1.3% | 1.3% | 4.3% | 2.6% | 0.2% | 0.0% | 5.4% | 2.0% |
| Nein | 60.0% | 53.9% | 57.2% | 66.5% | 66.6% | 55.1% | 66.1% | 80.9% | 62.0% |

Tabelle 3.4.14c_MB Anteil von Rauchenden, die von der Rauchstopplinie gehört und/oder schon angerufen haben – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende | Ex-Rauchende | Niemals-Rauchende | Total |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------|
| <i>n</i> ungewichtet | 874 | 357 | 0 | 0 | 1231 |
| <i>n</i> gewichtet | 853 | 343 | 0 | 0 | 1197 |
| Ja, ich habe davon gehört | 42.1% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 36.0% |
| Ja, und ich habe schon angerufen | 2.1% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Nein | 55.9% | 77.1% | 0.0% | 0.0% | 62.0% |

Tabelle 3.4.15a_MB Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 229 | 223 | 335 | 94 | 23 | 452 |
| <i>n</i> gewichtet | 243 | 172 | 299 | 100 | 16 | 415 |
| Ja | 2.5% | 4.2% | 3.9% | 1.6% | 0.0% | 3.2% |
| Nein | 84.0% | 80.8% | 83.5% | 81.5% | 74.9% | 82.7% |
| Eventuell | 13.5% | 15.0% | 12.6% | 16.8% | 25.1% | 14.1% |

Tabelle 3.4.15b_MB Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 82 | 92 | 103 | 44 | 42 | 45 | 39 | 5 | 452 |
| <i>n</i> gewichtet | 30 | 61 | 78 | 75 | 69 | 65 | 32 | 5 | 415 |
| Ja | 5.5% | 5.3% | 1.2% | 2.1% | 2.6% | 2.5% | 3.7% | 25.4% | 3.2% |
| Nein | 75.7% | 81.4% | 81.0% | 88.6% | 75.9% | 91.4% | 81.9% | 63.2% | 82.7% |
| Eventuell | 18.8% | 13.2% | 17.8% | 9.4% | 21.6% | 6.1% | 14.4% | 11.4% | 14.1% |

Tabelle 3.4.15c_MB Anteil der Rauchenden, die bei der Rauchstopplinie anrufen wollen (Rauchende, die davon gehört, aber noch nie angerufen haben) – Total und nach Rauchstatus

| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende | Ex-Rauchende | Niemals-Rauchende | Total |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------|
| <i>n</i> ungewichtet | 361 | 91 | 0 | 0 | 452 |
| <i>n</i> gewichtet | 343 | 72 | 0 | 0 | 415 |
| Ja | 3.4% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| Nein | 83.2% | 79.9% | 0.0% | 0.0% | 82.7% |
| Eventuell | 13.3% | 17.8% | 0.0% | 0.0% | 14.1% |

3.4.5 Aufhörversuche

Tabelle 3.4.16_MB Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich- und den Gelegenheitsrauchenden*)

| | Rauchende | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| | Täglich-Rauchende | Gelegenheits-rauchende |
| <i>n</i> ungewichtet | 852 | 180 |
| <i>n</i> gewichtet | 823 | 193 |
| Ja | 24.6% | 25.4% |
| Nein | 75.4% | 74.6% |

Anmerkung: *Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.4.17a_MB Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 394 | 458 | 617 | 193 | 42 | 852 |
| <i>n</i> gewichtet | 422 | 401 | 564 | 227 | 33 | 823 |
| Ja | 23.1% | 26.1% | 25.7% | 22.8% | 17.1% | 24.6% |
| Nein | 76.9% | 73.9% | 74.3% | 77.2% | 82.9% | 75.4% |

Tabelle 3.4.17b_MB *Aufhörversuch(e) in den letzten 12 Monaten (bei den Täglich-Rauchenden) – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 119 | 145 | 177 | 104 | 100 | 109 | 70 | 28 | 852 |
| <i>n</i> gewichtet | 45 | 92 | 144 | 176 | 156 | 122 | 66 | 21 | 823 |
| Ja | 35.6% | 21.3% | 30.7% | 22.9% | 20.6% | 22.3% | 30.4% | 12.1% | 24.6% |
| Nein | 64.4% | 78.7% | 69.3% | 77.1% | 79.4% | 77.7% | 69.6% | 87.9% | 75.4% |

Tabelle 3.4.18a_MB *Anzahl Aufhörversuche in den letzten 12 Monaten (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 95 | 122 | 160 | 49 | 8 | 217 |
| <i>n</i> gewichtet | 94 | 102 | 141 | 52 | 4 | 196 |
| 1 | 57.4% | 70.0% | 60.1% | 77.6% | 18.5% | 64.0% |
| 2-3 | 31.0% | 19.5% | 26.0% | 18.4% | 81.5% | 25.0% |
| 4-9 | 9.9% | 6.7% | 11.2% | 0.8% | 0.0% | 8.2% |
| 10+ | 1.7% | 3.8% | 2.7% | 3.1% | 0.0% | 2.8% |

Tabelle 3.4.18b_MB *Anzahl Aufhörversuche in den letzten 12 Monaten (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Alter*

| | Alter | | | | | | | | Total |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 44 | 32 | 51 | 25 | 19 | 20 | 22 | 4 | 217 |
| <i>n</i> gewichtet | 15 | 19 | 44 | 40 | 31 | 27 | 17 | 3 | 196 |
| 1 | 44.0% | 56.0% | 59.2% | 79.6% | 73.7% | 72.6% | 44.5% | 0.0% | 64.0% |
| 2-3 | 35.6% | 31.9% | 26.2% | 20.4% | 26.3% | 4.4% | 37.7% | 75.1% | 25.0% |
| 4-9 | 16.8% | 9.2% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 23.0% | 5.8% | 24.9% | 8.2% |
| 10+ | 3.6% | 2.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 2.8% |

Tabelle 3.4.19a_MB *Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion*

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 92 | 118 | 157 | 45 | 8 | 210 |
| <i>n</i> gewichtet | 86 | 90 | 133 | 40 | 4 | 177 |
| bis zu 1 Woche | 43.9% | 45.4% | 47.3% | 33.5% | 67.5% | 44.7% |
| zwischen 1 Woche und 1 Monat | 27.3% | 23.7% | 26.7% | 21.6% | 23.3% | 25.5% |
| über 1 Monat | 28.8% | 30.9% | 26.1% | 44.8% | 9.2% | 29.9% |

Tabelle 3.4.19b_MB Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | Total | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | | 75+ |
| <i>n ungewichtet</i> | 46 | 33 | 53 | 20 | 17 | 18 | 19 | 4 | 210 |
| <i>n gewichtet</i> | 16 | 20 | 44 | 34 | 27 | 19 | 14 | 3 | 177 |
| bis zu 1 Woche | 38.1% | 29.0% | 43.1% | 51.0% | 41.8% | 58.2% | 49.8% | 51.9% | 44.7% |
| zwischen 1 Woche und 1 Monat | 30.3% | 45.8% | 19.1% | 16.7% | 23.5% | 26.5% | 35.2% | 23.1% | 25.5% |
| über 1 Monat | 31.6% | 25.2% | 37.8% | 32.3% | 34.7% | 15.3% | 15.0% | 24.9% | 29.9% |

Tabelle 3.4.19c_MB Dauer des längsten Aufhörversuchs der letzten 12 Monate (Täglich-Rauchende mit Versuchen in diesem Zeitraum) – Total und nach Zigarettenkonsum

| | Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag | | | Total |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 1-5 | 6-10 | 11+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 33 | 82 | 95 | 210 |
| <i>n gewichtet</i> | 21 | 74 | 82 | 177 |
| bis zu 1 Woche | 39.3% | 31.8% | 57.7% | 44.7% |
| zwischen 1 Woche und 1 Monat | 35.3% | 33.5% | 15.6% | 25.5% |
| über 1 Monat | 25.3% | 34.7% | 26.7% | 29.9% |

Informationsquellen und Aufhörhilfe

Tabelle 3.4.20_MB Konsultierte Person(en)/Mittel zum Rauchstopp beim letzten Aufhörversuch (Täglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total | n ungewich- tet |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | | |
| <i>n ungewichtet</i> | 95 | 124 | 160 | 49 | 10 | 219 | |
| <i>n gewichtet</i> | 95 | 104 | 142 | 52 | 6 | 199 | |
| Arzt/Ärztin | 7.8% | 11.3% | 7.8% | 14.7% | 7.1% | 9.6% | 21 |
| Zahnarzt/Zahnärztin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| Apotheker/in | 13.8% | 6.9% | 9.0% | 12.0% | 25.0% | 10.2% | 10 |
| anderes Gesundheitspersonal | 4.8% | 11.5% | 4.9% | 18.7% | 0.0% | 8.3% | 11 |
| Partner/in oder Familienmitglied(er) | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 4.4% | 5.2% | 4.8% | 14 |
| Freund/e oder Bekannte | 12.1% | 2.3% | 7.7% | 5.4% | 5.2% | 7.0% | 19 |
| Rauchstoppkurse | 3.2% | 4.2% | 4.4% | 2.1% | 0.0% | 3.7% | 5 |
| persönliche oder telefonische Raucherberatung | 0.0% | 2.2% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1 |
| Information online (Internet) | 9.2% | 3.7% | 8.6% | 0.8% | 0.0% | 6.3% | 10 |
| Informationsbroschüren | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 5 |
| Bücher | 3.4% | 5.3% | 4.8% | 3.6% | 2.4% | 4.4% | 14 |
| andere(s) Mittel oder Person(en) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| keine besondere Person / kein besonderes Mittel | 56.8% | 53.9% | 58.1% | 46.9% | 60.3% | 55.3% | 131 |

Tabelle 3.4.21_MB Entwöhnungshilfe(n) beim letzten Aufhörversuch (Täglich-Rauchende mit Aufhörversuch) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total | n ungewichtet |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | | |
| n ungewichtet | 99 | 127 | 167 | 49 | 10 | 226 | |
| n gewichtet | 98 | 105 | 145 | 52 | 6 | 202 | |
| Nikotinkaugummi (Nikotinersatzpräparat) | 12.2% | 11.3% | 15.7% | 1.7% | 0.0% | 11.7% | 15 |
| Nikotinpflaster (Nikotinersatzpräparat) | 9.0% | 4.1% | 5.5% | 10.0% | 0.0% | 6.5% | 14 |
| Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpräparat) | 1.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1 |
| Nikotininhaler (Nikotinersatzpräparat) | 0.0% | 1.8% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 3 |
| andere Nikotinersatzpräparate (z.B. Microtabs) | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3 |
| persönliche Raucherberatung | 2.6% | 0.2% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 1.4% | 3 |
| Rauchstoppkurse | 1.7% | 0.9% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2 |
| Broschüren und Bücher | 1.9% | 4.9% | 4.1% | 1.6% | 2.4% | 3.5% | 8 |
| Selbsthilfegruppen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| Medikament Zyban mit dem Wirkstoff Bupropion | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| Rauchfreie Zigarette «NicStic» | 0.0% | 1.9% | 1.1% | 0.0% | 7.1% | 1.0% | 2 |
| andere E-Zigarettenart | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.7% | 1 |
| Medikament Champix | 2.3% | 5.1% | 3.1% | 5.5% | 2.9% | 3.7% | 6 |
| andere Hilfe(n) | 21.4% | 21.1% | 15.9% | 35.5% | 27.9% | 21.2% | 46 |
| keine besondere Hilfe | 55.0% | 53.6% | 56.3% | 47.7% | 62.7% | 54.3% | 141 |

3.4.6 Ex-Rauchende: Angaben zum Rauchstopp

Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit

Tabelle 3.4.22a Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Täglich-Rauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| n ungewichtet | 846 | 851 | 1289 | 321 | 87 | 1697 |
| n gewichtet | 1124 | 922 | 1474 | 461 | 111 | 2046 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 17.8 | 14.8 | 16.3 | 16.9 | 16.4 | 16.4 |
| Standardabweichung | 13.7 | 11.8 | 13.0 | 12.6 | 14.0 | 12.9 |

Anmerkung: *Rauchende, die während mindestens 6 Monaten täglich geraucht haben.

Tabelle 3.4.22b Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Täglich-Rauchenden*) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| n ungewichtet | 22 | 58 | 226 | 232 | 253 | 323 | 384 | 199 | 1697 |
| n gewichtet | 11 | 38 | 204 | 413 | 406 | 382 | 409 | 184 | 2046 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 0.8 | 2.6 | 5.3 | 8.7 | 14.2 | 20.1 | 24.6 | 29.0 | 16.4 |
| Standardabweichung | 1.8 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 9.1 | 11.3 | 13.6 | 14.2 | 12.9 |

Anmerkung: *Rauchende, die während mindestens 6 Monaten täglich geraucht haben.

Tabelle 3.4.23a Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 65 | 79 | 100 | 37 | 7 | 144 |
| <i>n</i> gewichtet | 94 | 75 | 103 | 59 | 8 | 170 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 16.2 | 18.4 | 17.1 | 16.3 | 23.7 | 17.1 |
| Standardabweichung | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 22.4 | 14.9 |

Anmerkung: *Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.4.23b Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei den Ex-Gelegenheitsrauchenden*) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 9 | 18 | 21 | 19 | 21 | 15 | 24 | 17 | 144 |
| <i>n</i> gewichtet | 3 | 10 | 23 | 40 | 38 | 16 | 23 | 16 | 170 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 1.0 | 1.1 | 8.7 | 8.5 | 18.6 | 26.8 | 30.2 | 31.9 | 17.1 |
| Standardabweichung | 1.0 | 1.6 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 11.3 | 15.9 | 20.0 | 14.9 |

Anmerkung: * Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.4.23c Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei allen Ex-Rauchenden*) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 455 | 493 | 721 | 181 | 46 | 948 |
| <i>n</i> gewichtet | 625 | 518 | 816 | 271 | 56 | 1144 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 17.4 | 16.3 |
| Standardabweichung | 13.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 15.6 | 12.8 |

Anmerkung: * Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Tabelle 3.4.23d Seit dem Rauchstopp vergangene Zeit (in Jahren) (bei allen Ex-Rauchenden*) – Total und nach Alter

| | Alter | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 19 | 46 | 127 | 128 | 140 | 167 | 210 | 111 | 948 |
| <i>n</i> gewichtet | 7 | 28 | 130 | 238 | 229 | 196 | 214 | 103 | 1144 |
| Durchschnitt (in Jahren) | 0.6 | 1.8 | 5.2 | 8.8 | 15.7 | 20.7 | 24.0 | 29.5 | 16.3 |
| Standardabweichung | 0.8 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 11.1 | 13.6 | 14.5 | 12.8 |

Anmerkung: * Nur für den Zeitraum Juli-Dezember 2011 erhobene Daten.

Zigarettenkonsum vor dem Rauchstopp

Tabelle 3.4.24a_MB Täglicher Zigarettenkonsum der Ex-Tätlich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 371 | 415 | 602 | 144 | 40 | 786 |
| <i>n gewichtet</i> | 538 | 441 | 709 | 215 | 54 | 978 |
| < 1 | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 1-5 | 9.3% | 24.0% | 15.5% | 16.0% | 21.5% | 15.9% |
| 6-10 | 19.2% | 28.5% | 20.5% | 32.6% | 24.8% | 23.4% |
| 11-15 | 6.8% | 11.2% | 9.4% | 6.5% | 9.9% | 8.8% |
| 16-20 | 43.8% | 25.3% | 38.6% | 29.4% | 19.7% | 35.5% |
| 21-30 | 6.2% | 5.5% | 6.1% | 5.1% | 5.1% | 5.9% |
| 31-40 | 8.5% | 2.2% | 4.7% | 5.2% | 19.1% | 5.6% |
| 41+ | 6.0% | 2.5% | 4.5% | 5.2% | 0.0% | 4.4% |

Tabelle 3.4.24b_MB Täglicher Zigarettenkonsum der Ex-Tätlich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Total |
|----------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 43 | 162 | 581 | 786 |
| <i>n gewichtet</i> | 38 | 191 | 749 | 978 |
| < 1 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% |
| 1-5 | 31.5% | 22.4% | 13.5% | 15.9% |
| 6-10 | 18.0% | 29.9% | 22.0% | 23.4% |
| 11-15 | 7.6% | 10.7% | 8.3% | 8.8% |
| 16-20 | 18.5% | 24.5% | 39.2% | 35.5% |
| 21-30 | 9.4% | 6.3% | 5.5% | 5.9% |
| 31-40 | 10.8% | 2.3% | 6.2% | 5.6% |
| 41+ | 4.2% | 3.8% | 4.6% | 4.4% |

Anzahl Versuche

Tabelle 3.4.25a_MB Anzahl Versuche der Ex-Tätlich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 375 | 416 | 605 | 146 | 40 | 791 |
| <i>n gewichtet</i> | 544 | 442 | 715 | 216 | 54 | 985 |
| 0 | 20.0% | 26.8% | 21.4% | 23.9% | 41.6% | 23.1% |
| 1 | 33.9% | 34.9% | 34.3% | 40.8% | 8.6% | 34.3% |
| 2-3 | 27.1% | 25.2% | 27.7% | 19.9% | 32.4% | 26.2% |
| 4-9 | 13.8% | 9.1% | 11.6% | 10.3% | 17.5% | 11.7% |
| 10+ | 5.3% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 4.7% |

Tabelle 3.4.25b_MB Anzahl Versuche der Ex-Taglich-Rauchenden vor dem Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Anzahl gerauchter Zigaretten vor Rauchstopp | | | | Total |
|----------------------|------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 42 | 159 | 590 | 137 | 189 | 318 | 135 | 779 |
| <i>n</i> gewichtet | 38 | 187 | 761 | 159 | 224 | 432 | 159 | 974 |
| 0 | 21.3% | 22.2% | 23.4% | 31.3% | 19.6% | 21.1% | 24.6% | 23.0% |
| 1 | 37.7% | 33.4% | 34.4% | 46.3% | 40.9% | 28.3% | 31.2% | 34.6% |
| 2-3 | 13.8% | 31.0% | 25.7% | 16.8% | 25.1% | 29.4% | 27.7% | 26.1% |
| 4-9 | 24.8% | 10.6% | 11.3% | 4.2% | 7.4% | 16.3% | 11.7% | 11.5% |
| 10+ | 2.5% | 2.8% | 5.3% | 1.4% | 6.9% | 4.9% | 4.8% | 4.8% |

Konsumreduktion vor dem Rauchstopp

Tabelle 3.4.26a_MB Konsumreduktion vor dem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 377 | 419 | 611 | 145 | 40 | 796 |
| <i>n</i> gewichtet | 546 | 443 | 720 | 215 | 54 | 989 |
| Ja | 19.3% | 25.6% | 20.2% | 27.6% | 25.5% | 22.1% |
| Nein | 80.7% | 74.4% | 79.8% | 72.4% | 74.5% | 77.9% |

Tabelle 3.4.26b_MB Konsumreduktion vor dem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Anzahl gerauchter Zigaretten vor Rauchstopp | | | | Total |
|----------------------|------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21+ | |
| <i>n</i> ungewichtet | 43 | 163 | 590 | 138 | 191 | 320 | 135 | 784 |
| <i>n</i> gewichtet | 38 | 191 | 759 | 159 | 226 | 433 | 159 | 977 |
| Ja | 13.2% | 30.8% | 20.4% | 30.2% | 29.5% | 17.6% | 17.4% | 22.3% |
| Nein | 86.8% | 69.2% | 79.6% | 69.8% | 70.5% | 82.4% | 82.6% | 77.7% |

Tabelle 3.4.27a_MB Hat die Konsumreduktion den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp geholfen? – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|----------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n</i> ungewichtet | 73 | 97 | 125 | 37 | 8 | 170 |
| <i>n</i> gewichtet | 104 | 111 | 143 | 58 | 14 | 215 |
| Ja | 60.3% | 62.3% | 64.1% | 56.2% | 54.4% | 61.3% |
| Nein | 39.7% | 37.7% | 35.9% | 43.8% | 45.6% | 38.7% |

Tabelle 3.4.27b_MB Hat die Konsumreduktion den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp geholfen – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Anzahl gerauchter Zigaretten vor Rauchstopp | | | | Total |
|----------------------|------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 9 | 43 | 118 | 40 | 54 | 56 | 20 | 170 |
| <i>n gewichtet</i> | 5 | 59 | 151 | 48 | 67 | 74 | 26 | 215 |
| Ja | 92.2% | 55.2% | 62.7% | 67.2% | 64.3% | 61.5% | 42.5% | 61.3% |
| Nein | 7.8% | 44.8% | 37.3% | 32.8% | 35.7% | 38.5% | 57.5% | 38.7% |

Tabelle 3.4.28a_MB Angewendete Strategie zur Konsumreduktion vor gelungenem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|-------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 63 | 87 | 113 | 31 | 6 | 150 |
| <i>n gewichtet</i> | 88 | 95 | 128 | 43 | 11 | 182 |
| erste Zigarette hinauszogern | 25.2% | 16.6% | 19.8% | 18.7% | 40.0% | 20.7% |
| immer weniger rauchen | 68.3% | 67.4% | 67.1% | 72.1% | 60.0% | 67.8% |
| beides | 6.5% | 16.0% | 13.1% | 9.3% | 0.0% | 11.4% |

Tabelle 3.4.28b_MB Angewendete Strategie zur Konsumreduktion vor gelungenem Rauchstopp (Ex-Taglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp und fruherem Zigarettenkonsum

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Anzahl gerauchter Zigaretten vor Rauchstopp | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | <1 | 1-5 | 6+ | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 9 | 38 | 103 | 36 | 47 | 49 | 17 | 149 |
| <i>n gewichtet</i> | 5 | 44 | 133 | 39 | 57 | 63 | 23 | 182 |
| erste Zigarette hinauszogern | 33.9% | 21.9% | 19.8% | 13.6% | 21.4% | 24.9% | 19.8% | 20.7% |
| immer weniger rauchen | 40.3% | 71.7% | 67.6% | 77.6% | 65.4% | 63.0% | 70.3% | 67.8% |
| beides | 25.8% | 6.4% | 12.6% | 8.8% | 13.1% | 12.1% | 9.9% | 11.4% |

Aufhörgründe

Tabelle 3.4.29a_MB Wichtigste Aufhörgründe der Ex-Täglich-Rauchenden – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 375 | 420 | 611 | 144 | 40 | 795 |
| <i>n gewichtet</i> | 543 | 445 | 721 | 213 | 54 | 988 |
| um Krankheiten vorzubeugen | 27.7% | 30.6% | 28.6% | 30.8% | 26.8% | 29.0% |
| wegen tabakbedingter Erkrankung oder Beschwerden | 15.2% | 9.6% | 13.6% | 10.4% | 10.1% | 12.7% |
| wegen nicht tabakbedingter Erkrankung oder Beschwerden | 8.0% | 6.7% | 6.0% | 11.3% | 10.3% | 7.4% |
| um Geld zu sparen | 10.1% | 6.1% | 8.2% | 9.4% | 4.5% | 8.3% |
| kein Genuss mehr beim Rauchen | 11.6% | 11.1% | 11.0% | 12.1% | 14.3% | 11.4% |
| Partner/in hat aufgehört | 6.1% | 5.2% | 5.8% | 6.3% | 1.0% | 5.7% |
| war beim Sport und körperlichen Leistungen nicht mehr so fit | 9.1% | 3.5% | 7.2% | 6.1% | 0.0% | 6.5% |
| Schwangerschaft / Schwangerschaft der Partnerin | 3.8% | 22.6% | 11.5% | 14.2% | 14.5% | 12.3% |
| Wunsch oder Drängen von anderen | 5.0% | 4.6% | 3.5% | 9.3% | 4.5% | 4.8% |
| möchte nicht abhängig sein | 11.2% | 12.2% | 9.6% | 17.2% | 17.6% | 11.7% |
| wegen des schlechten Geruchs | 8.0% | 9.7% | 7.8% | 13.0% | 5.0% | 8.7% |
| wegen tabakbedingter Erkrankung bei Verwandten und Freunden | 2.8% | 2.8% | 1.6% | 6.5% | 3.7% | 2.8% |
| Empfehlung von Arzt/Ärztin (ohne Zahnarzt) | 2.6% | 1.4% | 2.1% | 1.5% | 3.6% | 2.1% |
| Empfehlung von Zahnarzt/DH | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| Beratung in der Apotheke | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| um die Angehörigen/Partner/in nicht zu stören | 4.2% | 6.4% | 4.8% | 7.9% | 0.0% | 5.2% |
| Bewusstwerden über gesundheitliche Folgen des Rauchens | 17.3% | 13.5% | 16.7% | 11.2% | 18.3% | 15.6% |
| anderer Grund / andere Gründe | 12.8% | 12.6% | 12.0% | 17.4% | 4.0% | 12.7% |
| kein besonderer Grund | 4.8% | 1.8% | 3.4% | 2.9% | 5.8% | 3.4% |

Tabelle 3.4.29b_MB Wichtigste Aufhörgründe (Ex-Täglich-Rauchende) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp

| | Anz. Jahre seit Rauchstopp | | | Total |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 43 | 162 | 590 | 795 |
| <i>n gewichtet</i> | 38 | 191 | 759 | 988 |
| um Krankheiten vorzubeugen | 42.0% | 25.7% | 29.2% | 29.0% |
| wegen tabakbedingter Erkrankung oder Beschwerden | 8.7% | 10.0% | 13.6% | 12.7% |
| wegen nicht tabakbedingter Erkrankung oder Beschwerden | 9.8% | 3.1% | 8.3% | 7.4% |
| um Geld zu sparen | 11.5% | 11.7% | 7.2% | 8.3% |
| kein Genuss mehr beim Rauchen | 12.6% | 15.5% | 10.3% | 11.4% |
| Partner/in hat aufgehört | 3.4% | 7.1% | 5.4% | 5.7% |
| war beim Sport und körperlichen Leistungen nicht mehr so fit | 9.5% | 6.9% | 6.3% | 6.5% |
| Schwangerschaft / Schwangerschaft der Partner/in | 11.2% | 12.4% | 12.3% | 12.3% |
| Wunsch oder Drängen von anderen | 8.1% | 5.8% | 4.4% | 4.8% |
| möchte nicht abhängig sein | 15.2% | 9.2% | 12.1% | 11.7% |
| wegen des schlechten Geruchs | 10.3% | 8.8% | 8.6% | 8.7% |
| wegen tabakbedingter Erkrankung bei Verwandten und Freunden | 6.1% | 1.2% | 3.0% | 2.8% |
| Empfehlung von Arzt/Ärztin (ohne Zahnarzt) | 0.0% | 2.6% | 2.0% | 2.1% |
| Empfehlung von Zahnarzt/DH | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% |
| Beratung in der Apotheke | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| um die Angehörigen/Partner/in nicht zu stören | 4.7% | 4.1% | 5.5% | 5.2% |
| Bewusstwerden über gesundheitliche Folgen des Rauchens | 18.7% | 9.2% | 17.0% | 15.6% |
| anderer Grund/andere Gründe | 10.9% | 19.9% | 11.0% | 12.7% |
| kein besonderer Grund | 6.2% | 4.3% | 3.1% | 3.4% |

Informationsquellen und Entwöhnungshilfen

Tabelle 3.4.30a_MB Von den Ex-Täglich-Rauchenden konsultierte Person(en) oder Mittel zur Informationsbeschaffung beim Rauchstopp – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Männer | Frauen | deutsch | französisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 369 | 411 | 602 | 138 | 40 | 780 |
| <i>n gewichtet</i> | 531 | 436 | 710 | 203 | 54 | 967 |
| Arzt/Ärztin | 6.6% | 2.7% | 3.8% | 9.8% | 1.2% | 4.9% |
| Zahnarzt/Zahnärztin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Apotheker/in | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.7% | 2.0% | 0.5% |
| anderes Gesundheitspersonal | 1.6% | 3.1% | 2.1% | 3.6% | 0.0% | 2.3% |
| Partner/in oder Familienmitglied(er) | 3.6% | 3.2% | 3.8% | 2.6% | 2.6% | 3.4% |
| Freund/e oder Bekannte | 2.3% | 1.3% | 1.3% | 4.2% | 0.0% | 1.8% |
| Rauchstoppkurse | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | 2.0% | 0.6% |
| persönliche oder telefonische Raucherberatung | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.2% |
| Information online (Internet) | 1.4% | 1.8% | 1.0% | 1.1% | 12.1% | 1.6% |
| Informationsbroschüren | 2.3% | 1.6% | 2.0% | 1.5% | 3.1% | 2.0% |
| Bücher | 5.0% | 6.6% | 6.8% | 3.6% | 0.0% | 5.7% |
| andere(s) Mittel oder Person(en) | 2.8% | 1.4% | 1.8% | 1.3% | 10.1% | 2.2% |
| keine besondere Person / kein besonderes Mittel | 75.8% | 81.7% | 79.3% | 77.1% | 72.1% | 78.5% |

Tabelle 3.4.30b_MB Von den Ex-Täglich-Rauchenden konsultierte Person(en) oder Mittel zur Informationsbeschaffung beim Rauchstopp – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp

| | Anzahl Jahre seit Rauchstopp | | | Total |
|---|------------------------------|-------|-------|-------|
| | < 1 | 1-5 | 6+ | |
| <i>n ungewichtet</i> | 42 | 157 | 581 | 780 |
| <i>n gewichtet</i> | 38 | 183 | 745 | 967 |
| Arzt/Ärztin | 15.7% | 3.7% | 4.6% | 4.9% |
| Zahnarzt/Zahnärztin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Apotheker/in | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| anderes Gesundheitspersonal | 3.9% | 0.8% | 2.5% | 2.3% |
| Partner/in oder Familienmitglied(er) | 1.2% | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| Freund/e oder Bekannte | 0.8% | 0.5% | 2.2% | 1.8% |
| Rauchstoppkurse | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 0.6% |
| persönliche oder telefonische Raucherberatung | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
| Information online (Internet) | 1.3% | 4.0% | 1.0% | 1.6% |
| Informationsbroschüren | 2.2% | 0.0% | 2.4% | 2.0% |
| Bücher | 8.7% | 3.5% | 6.1% | 5.7% |
| andere(s) Mittel oder Person(en) | 0.0% | 0.5% | 2.7% | 2.2% |
| keine besondere Person / kein besonderes Mittel | 69.7% | 81.6% | 78.1% | 78.5% |

Tabelle 3.4.31a_MB Von den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp verwendete Entwohnungshilfe(n) – Total und nach Geschlecht und Sprachregion

| | Geschlecht | | Sprachregion | | | Total |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | Manner | Frauen | deutsch | franzosisch | italienisch | |
| <i>n ungewichtet</i> | 367 | 416 | 603 | 142 | 38 | 783 |
| <i>n gewichtet</i> | 533 | 441 | 712 | 210 | 52 | 974 |
| Nikotinkaugummi (Nikotinersatzpreparat) | 2.1% | 3.2% | 2.4% | 3.7% | 0.0% | 2.6% |
| Nikotinpflaster (Nikotinersatzpreparat) | 1.8% | 3.8% | 2.3% | 4.7% | 0.0% | 2.7% |
| Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpreparat) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.1% |
| Nikotininhaler (Nikotinersatzpreparat) | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 0.4% |
| andere Nikotinersatzpreparate (z.B. Microtabs) | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| personliche Raucherberatung | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| Rauchstoppkurse | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.6% |
| Broschuren und Bucher | 0.8% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 3.2% | 0.5% |
| Selbsthilfegruppen | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.2% |
| Medikament Zyban mit dem Wirkstoff Bupropion | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.3% |
| rauchfreie Zigarette «NicStic» | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| andere E-Zigarettenart | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% |
| Medikament Champix | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| andere Hilfe(n) | 9.9% | 9.6% | 9.7% | 9.6% | 11.2% | 9.8% |
| keine besondere Hilfe | 83.0% | 83.6% | 84.5% | 78.8% | 85.6% | 83.3% |

Tabelle 3.4.31b_MB Von den Ex-Taglich-Rauchenden beim Rauchstopp verwendete Entwohnungshilfe(n) – Total und nach Anzahl Jahren seit dem Rauchstopp

| | Anz. Jahre seit Rauchstopp | | | Total | N ungewichtet |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | <1 | 1-5 | 6+ | | |
| <i>n ungewichtet</i> | 41 | 158 | 584 | 783 | |
| <i>n gewichtet</i> | 36 | 187 | 751 | 974 | |
| Nikotinkaugummi (Nikotinersatzpreparat) | 11.9% | 2.7% | 2.1% | 2.6% | 23 |
| Nikotinpflaster (Nikotinersatzpreparat) | 0.0% | 2.3% | 2.9% | 2.7% | 15 |
| Nikotinnasenspray (Nikotinersatzpreparat) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 1 |
| Nikotininhaler (Nikotinersatzpreparat) | 1.2% | 1.3% | 0.1% | 0.4% | 3 |
| andere Nikotinersatzpreparate (z.B. Microtabs) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 2 |
| personliche Raucherberatung | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 0.3% | 3 |
| Rauchstoppkurse | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.6% | 1 |
| Broschuren und Bucher | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 5 |
| Selbsthilfegruppen | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 2 |
| Medikament Zyban mit dem Wirkstoff Bupropion | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 1 |
| rauchfreie Zigarette «NicStic» | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| andere E-Zigarettenart | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1 |
| Medikament Champix | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1 |
| andere Hilfe(n) | 7.5% | 13.5% | 8.9% | 9.8% | 80 |
| keine besondere Hilfe | 76.7% | 80.1% | 84.4% | 83.3% | 653 |